

DIE BEHANDLUNG
DEGENERATIVER ERKRANKUNGEN
DER WIRBELSÄULE UND GELENKE
BEIM HUND MIT ZYTOPLASMATISCHEN
PRÄPARATEN IM VERGLEICH
ZU ANDEREN THERAPEUTISCHEN
METHODEN

Edgar Freiherr von Cramm

Disbui. München

1987





Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554605_0027

Aus der 1. Medizinischen Tierklinik der Tierärztlichen
Fakultät der Universität München
Vorstand: Prof. Dr. W. Kraft

Angefertigt unter Leitung von Prof. Dr. H. Kraft

DIE BEHANDLUNG DEGENERATIVER ERKRANKUNGEN DER WIRBEL-
SÄULE UND GELENKE BEIM HUND MIT ZYTOPLASMATISCHEN
PRÄPARATEN IM VERGLEICH ZU ANDEREN THERAPEUTISCHEN
METHODEN

I n a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n
zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde
der Tierärztlichen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität München

von
Edgar Freiherr von Cramm
aus
Göttingen

München
1986

Gedruckt mit Genehmigung der Tierärztlichen
Fakultät der Universität München

Dekan: Prof. Dr. H. Zucker

Referent: Prof. Dr. H. Kraft

Koreferent: Prof. Dr. Dr. D. Stavrou

Tag der Promotion: 27. Februar 1987

Druck: DISSERTATIONS- UND FOTODRUCK FRANK GmbH
8000 München 2, Gabelsbergerstr. 15, Tel. 288663

G e w i d m e t

meinem Lehrer

Dr. Wilfried Müller, Wuppertal

in großer Dankbarkeit

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1	Einleitung	1
2	Literatur	2
2.1	Zur Anatomie und Physiologie der Gelenke	2
2.2	Degenerative Erkrankungen	4
2.3	Zytoplasmatische Therapie	15
3	Eigene Untersuchungen	31
3.1	Material	31
3.2	Methodik	37
3.3	Ergebnisse	48
3.4	Diskussion	132
4	Zusammenfassung	144
	Summary	147
5	Literaturverzeichnis	150

TABELLENLISTE

Seite

1	Bewertung 100. Tag Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen	62
2	Bewertung 180. Tag Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen	64
3	Bewertung Tag E Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen	66
4	Bewertung Therapie B am 100. und 180. Tag p.p.i. sowie an Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung)) Gesamt und nach Diagnose- und Therapiegruppen	68
5	Nach Alters- und Therapiegruppen	70
6	Nach Rasse- und Therapiegruppen	72
7	Nach Therapieart und Therapiegruppen	74
8	Nach Geschlechts- und Therapiegruppen	76
9	Bewertung 100. Tag Therapie $A_{(B)}$, B_A und B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen	78
10	Bewertung 180. Tag Therapie $A_{(B)}$, B_A , A_{Gesamt} und B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen	80
11	Bewertung Tag E Therapie $A_{(B)}$, B_A und B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen	82
12	Rezidive bis zum 100. und 180. Tag und bis Tag E für Therapie $A_{(B)}$, B_A , A_{Gesamt} und B_{Gesamt}	84
13	A bis D Laboruntersuchungen	87
14	Zusammenfassung der Laboruntersuchungen	91
15	Gesamtübersicht	94

1 EINLEITUNG

Degenerative Gelenkerkrankungen sind in Tier- wie Humanmedizin sehr schwer und meist nur unbefriedigend therapeutisch zu beeinflussen. Die klassische Therapie beschränkt sich auf die Behandlung der Symptome. Chirurgische Maßnahmen sind meist aufwendig, kostenintensiv und nicht immer erfolgversprechend.

Seit über 30 Jahren bietet Prof. THEURER mit seiner zytoplasmatischen Therapie, die auf der Grundidee der NIEHANS'schen Frischzelltherapie basiert, eine Therapieform an, die allerdings erst seit einiger Zeit in größeren medizinischen Kreisen vehement diskutiert und ausprobiert wird. Die Therapeuten in Human- wie Tiermedizin berichten von erstaunlichen therapeutischen Ergebnissen auch bei bisher als unbeeinflussbar geltenden Krankheiten.

Gerade im Bereich der degenerativen Gelenkerkrankungen wird von verschiedenen Autoren über gute Ergebnisse berichtet.

Ziel dieser Arbeit soll sein, den therapeutischen Effekt der zytoplasmatischen Therapie bei Hunden mit degenerativen Gelenkerkrankungen zu beschreiben und, soweit möglich, mit den im allgemeinen in der Kleintierorthopädie angewandten therapeutischen Maßnahmen zu vergleichen.

Gleichzeitig sollen schädliche Nebenwirkungen dieser Therapie beobachtet und beschrieben werden.



2 LITERATUR

2.1 Zur Anatomie und Physiologie der Gelenke

NICKEL, SCHUMMER und WILLE (1977) teilen die Gelenke nach ihrer Art in einfache und zusammengesetzte Gelenke sowie nach ihrem Typus in Kugel-, Ellipsoid-, Sattel-, Walzen-, Zapfen-, Schiebe- und straffe Gelenke ein.

Bei den Walzengelenken unterscheiden sie das Scharnier-, Schrauben-, Schlitten- und Spiralgelenk.

Allen Gelenken gemeinsam ist nach denselben Autoren sowie nach DÄMMRICH, BRASS und SCHEBITZ (1975) ihre Zusammensetzung:

Von innen nach außen folgt auf die Knochensubstanz der artikulierenden Knochen der hyaline Gelenkknorpel, der die Knochenenden überzieht. Er enthält bei der Geburt ca. 90 % Wasser. Dieser Anteil geht mit dem Alter auf ca. 40 % zurück. Ebenso sinkt auch der Anteil der Knorpelzellen und der Chondroitinschwefelsäure. Der adulte Knorpel teilt sich in einen dem Knochen direkt aufliegenden mineralisierten und einen, durch eine basophile Kittlinie abgetrennten nicht mineralisierten Teil, der durch die Synovialflüssigkeit ernährt wird.

Bei Immobilisation des Gelenkes sowie durch die altersbedingte Abnahme des Wassergehaltes und der Chondroitinschwefelsäure wird die Knorpeler-nährung reduziert weil diese offenbar nicht nur von hohem Wasser- und Chondroitinschwefelsäuregehalt des Knorpels, sondern auch von häufiger Be- und Entlastung abhängig ist.

Die Gelenkkapsel verbindet die Knorpelränder miteinander. Sie besteht aus einem äußeren Stratum fibrosum und einem inneren Stratum synoviale.

Zwischen beiden Blättern kann eine Verschiebeschicht angelegt sein, die aus lockerem Binde- und Fettgewebe besteht. Das Stratum synoviale sezerniert und resorbiert die Synovialflüssigkeit, die einerseits für die Ernährung des Knorpels zuständig ist, andererseits die Knorpelflächen als Schmier- und Gleitmittel voneinander trennt. Außer 96 bis 99 % Wasser enthält die Synovia Glykoproteine (Globulin und Mucopolysaccharid), die die Viskosität der Synovia bedingen, ferner Hyaluronsäure, Eiweiß und Elektrolyte in einer dem Blut entsprechenden Konzentration. Zusätzlich können in gesunden Gelenken Mono-, Lympho- und Leukozyten sowie Synovialiszellen auftreten. Auch abgeschilferte Gelenkknorpelsubstanz kann vereinzelt beobachtet werden.

WANDERKA (1983) beschreibt den Gelenkinnenraum als geschlossenes hydraulisches Stoßdämpfungs- und Pumpsystem. Die Synovialflüssigkeit wird bei Belastung in die molekularen Zwischenräume des hyalinen Knorpels gepreßt. Die hierbei mitgeführte Glukose wird von den Chondrozyten zur anaeroben Glykolyse genutzt. Laktat als Endprodukt dieser Glykolyse regt wiederum die Synovialzellen zur Glucosefreisetzung an. Die Chondrozyten produzieren die Proteoglykane als gelartige Grundsubstanz, die zusammen mit dem Gerüst aus kollagenen Fasern 99,9 % der nichtmineralisierten Knorpelmasse ausmachen. Nur 0,1 % der Knorpelmasse besteht aus Chondrozyten. Nach KALBHEN (1985) werden

die Proteoglykane hauptsächlich bei Druck-, die Kollagenfasern mehr bei Zugbelastung in Anspruch genommen.

Die Anatomie und Physiologie der Wirbelsäulengelenke entspricht nach NICKEL, SCHUMMER und WILLE (1977) in Aufbau und Funktion dem eben beschriebenen. Abweichend hiervon werden jedoch die Wirbelkörperenden nicht durch Knorpel und Synovialflüssigkeit voneinander getrennt, sondern durch sogenannte Zwischenwirbelscheiben, Disci intervertebrales. Diese bestehen aus dem gallertigen Kern, Nucleus pulposus und dem, den Kern umschließenden Anulus fibrosus, einem Ring aus Faserknorpel und fibrösem Bindegewebe. Der Nucleus pulposus wirkt wie die Synovialflüssigkeit wie ein Wasserkissen als Stoßdämpfer.

Zum Verständnis des Bandscheibenvorfalles und seiner Folgen ist es wichtig zu wissen, daß der Nucleus pulposus im dorsalen Drittel der Zwischenwirbelscheibe liegt und der Anulus fibrosus im ventralen Bereich dicker als im dorsalen Bereich ist. (HAVRANEK-BALZARETTI 1980).

2.2 Degenerative Erkrankungen

RUBARTH und BJÖRKLUND (1972) definieren die Degeneration als Stoffwechselstörung bei der der Gleichgewichtszustand zwischen anabolischen und katabolischen Prozessen dadurch gestört ist, daß einer von diesen mit abnorm gesteigerter oder abnorm verminderter Geschwindigkeit verläuft. Ein degenerativer Prozeß im klassischen Sinne ist irreversibel.

SANDERSLEBEN (1981) definiert die Degeneration einer Zelle als ihre reversible Schädigung und letzte Stufe vor ihrem Untergang (Nekrose).

2.2.1 Degenerative Erkrankungen der Gelenke

2.2.1.1 Arthropathia deformans (Arthrosis deformans)

Veränderungen im Sinne der Arthropathia deformans lassen sich schon an Knochenfunden aus dem letzten vorchristlichen Jahrhundert erkennen. Man nimmt an, daß die Veränderungen an den gefundenen Pferdemetatarsen und -phalangen als Folge von Überlastung durch die im Verhältnis zur Größe der Tiere zu schweren Reiter aufgetreten sind. VEGETIUS hat Ende des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus wohl als erster eine eingehende Besprechung der degenerativen Gelenkerkrankungen versucht. (BOESSNEK 1975).

Bis heute ist eine klare Definition schwierig, da die Arthropathia deformans ihre Ursache in unterschiedlichen Erkrankungen haben kann. Morphologisch ist sie eine nichtentzündliche degenerative Knorpelveränderung. Anamnestisch läßt sich jedoch oft nicht mehr klären, ob eine primär degenerative Veränderung vorliegt, oder ob eine andere Gelenkerkrankung zu chronischen Veränderungen geführt hat. (DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1975). An anderer Stelle wird die Arthropathia deformans jedoch klar als primär nichtentzündliche chronische und unheilbare Gelenkerkrankung bezeichnet. (DÄMMRICH 1981).

Zusammenfassend kann man sagen, daß degenerative Prozesse im Gelenk immer ihre Ursache in einer Ernährungsstörung der Chondrozyten haben, wobei die Ursache für die Ernährungsstörung dann keine Rolle mehr spielt. (KNECHT 1982).

Als Ursache für Ernährungsstörungen der Chondrozyten im Knorpelgewebe kommen in Frage:

Entwicklungsstörungen wie:

- Hüftgelenkdysplasie (Dysplasia acetabuli),
- Aseptische Nekrose des Caput femoris (Calvé-Legg-Perthes' Erkrankung),
- Aseptische Nekrose des Caput humeri (Osteochondrosis dissecans),
- Processus anconaeus isolatus,
- Angeborene Luxatio patellae,
- Adaptationsprobleme (Mißverhältnis zwischen schneller Gewichtszunahme und langsamer Skelettentwicklung v.a. bei Mastschweinen und Mastrindern, aber auch bei großwüchsigen Hunden),
- Epiphysiolysis.

Die Entwicklungsstörungen haben wiederum oft andere auslösende Ursachen wie erbliche Disposition, falsche Ernährung, Vitamin-, und Mineralstoffmangel, Stoffwechselstörungen u.ä. Weiterhin kommen als Ursache in Frage:

- Arthritiden septischer und aseptischer Art,
- Polyarthritiden,
- Traumata wie Quetschungen, Verstauchungen und Verrenkungen, die zunächst jedoch meist eine Arthritis nach sich ziehen werden. (DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1975; MÜLLER 1976; KRAFT 1980; DÄMMRICH 1981; DAHME 1982; HOFFMANN 1985).

Der histomorphologisch-pathologische Verlauf einer Arthrose sieht folgendermaßen aus:

Jede Störung des Regelkreislaufes (anaerobe Glykolyse im Chondrozyt - Laktat - Stimulierung der Synovialzellen - Glucoseausschüttung - anaerobe Glykolyse usw.) führt zu einem verminderten Laktatanfall und damit zu einem verminderten Glucoseangebot. Steht dem Chondrozyten nicht mehr genügend Glucose zur Verfügung, schaltet er auf oxydative Verbrennung um, um seinen Energiebedarf weiterhin zu decken. Dabei gehen Teile der Chondrozyten zugrunde und zerfallen. Die hierbei freiwerdenden Enzyme zerstören die Trägersubstanzen:

- | | |
|-----------------------|--|
| Mucopolysaccharidasen | - Mucopolysaccharide |
| Proteasen | - Trägerproteine |
| Hyaluronidasen | - Hyaluronsäure (hält das Proteoglykanaggregat zusammen) |
| Kollagenasen | - kollagenes Stützgerüst. |

Mit zunehmenden Chondrozytonekrosen verliert der Knorpel seine Regenerationsfähigkeit vollständig. Es kommt zu lokalen Defekten (Usuren) und im subchondralen und knöchernen Bereich der Gelenkmatrix zu Einbrüchen mit Blutungen, Nekrosen und Zysten. Durch resorptiv-proliferative Prozesse wird einerseits der Gelenkknorpel abgebaut, andererseits eine grobe, knöcherne Gelenkfläche geschaffen. Schließlich kommt es zur Bildung sog. POMMERSCHER Randwülste, das sind Knochenproliferationen. (DÄMMRICH 1981; DAHME 1983; WANDERKA 1983 und 1985).

Die Arthropathia deformans läßt sich in 4 Stadien einteilen:

Stadium I: Röntgenologisch und klinisch keine Symptome; histologisch jedoch bereits weitgehende Zerstörung an der Oberfläche, Klasterbildung, Grobfibrillation, Fehlen funktionsfähiger Knorpelzellen.

Stadium II: Röntgenologisch: Verschmälerung des Gelenkspaltes, Osteophytenauflagerungen.

Klinisch: Morgensteifigkeit.

Histologisch: Oberflächendefekte, Ulcerationen, Einrisse und Spaltungen, Klasterbildung, Fibrose in den Markräumen, subchondrale Osteosklerose, Abschleiß der demaskierten Knorpelsubstanz.

Stadium III: Röntgenologisch: Gelenkspalt schmal, Osteophytenauflagerungen, Geröllzysten im Knochen.

Klinisch: Schmerzen, entzündliche Schübe, deutliche Gelenkeinschränkungen.

Histologisch: Knorpel weitgehend verschwunden, Eröffnung der Markräume, Glattschliff des subchondralen Knochens.

Stadium IV: Röntgenologisch: Deformation, Zubildungen.

Klinisch: Gelenk versteift, sehr schmerzhaft (z.T. sekundär durch Synovitis).

Histologisch: Bindegewebszubildung,
Gefäßaussprossung. (Nach LACHNIT
1985).

Therapie: Grundsätzlich ist zu beachten, daß eine Therapie zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen muß. Auch eine Polyarthrititis infektiosa führt über eine Polyarthrititis chronica letztendlich zu einer Arthropathia deformans. (DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1975; DROMMER 1981; HOFFMANN 1985).

Vorgeschlagen werden folgende Therapiearten:

Phenylbutazon

Glucocorticoide

Analgetika

Interzellulärsubstanzen (Arteparon^R - Luitpold)

Enzymhemmung (Trasylol^R - Bayer)

Hyperämisierende Maßnahmen

Mikrowellenbestrahlung

Käfigruhe

Chirurgische Maßnahmen:

Osteotomie mit Osteosynthese

Partielle Myoektomie der Musculi pectinei

Plastischer Gelenkersatz

(DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1975; MÜLLER 1984, mündliche Mitteilungen).

Wichtig ist in jedem Fall die sterile Punktion der betroffenen Gelenke:

1. um die Gelenke zu entlasten und damit die Ursache der Schmerzen zu entfernen,
2. um die Ergußflüssigkeit beurteilen zu können.

Weitere therapeutische Maßnahmen sind:

Verabreichung von Vitamin-B-Präparaten und Pro-cainhydrochlorid (Impletol^R - Bayer) und Magnetfeldbestrahlungen (MÜLLER 1984).

2.2.2 Degenerative Erkrankungen an der Wirbelsäule

2.2.2.1 Spondylarthropathia deformans

Ursache und Verlauf der Spondylarthropathia deformans entsprechen denen der Arthropathia deformans (KNECHT 1982) und wurden dort eingehend beschrieben.

Klinisch stehen die röntgenologischen und die klinischen Befunde häufig in krassem Gegensatz zueinander. (DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1975).

Therapeutisch wird empfohlen:

Wärmebehandlung (z.B. Mikrowellenbestrahlung)
Phenylbutazon

Glucocorticoide und andere Antiphlogistika

Analgetika

Konsequente Schonung

(EIKMEIER et. al. 1980; DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1985).

2.2.2.2 Spondylopathia deformans

Diese bei manchen Rassen gehäuft auftretende Erkrankung der Wirbelsäule kann traumatische Ursachen haben, meist ist sie jedoch Folge einer Rassedisposition für diese Krankheit. Vor allem die Doggenrassen (Deutsche Dogge, Boxer) sind betroffen. Der Prozeß der osteophytischen Zubil-

dungen im Bandverlauf beginnt oft schon in früherster Jugend auf dem ventralen Kamm der betroffenen Wirbelsäulenabschnitte. Die Zubildungen überbrücken sehr bald den Abstand zwischen zwei benachbarten Wirbeln (Ankylose). Von einer "Bambusstab-Wirbelsäule" wird gesprochen, wenn mehrere aufeinanderfolgende Wirbel, vor allem im Bereich der Lendenwirbelsäule, betroffen sind. Bei der konstitutionellen Spondylopathia sind vor allem die letzten beiden Brustwirbel und die gesamte Lendenwirbelsäule betroffen. Die traumatisch bedingte Spondylopathia erhält ihre "Initialzündung" meist durch eine plötzliche übermäßige Beanspruchung der Zwischenwirbelscheibe. Als Folge kann es zur aseptischen Nekrose der Zwischenwirbelscheibe kommen. Diese Form ist an keine Rasse oder Alter gebunden.

Klinisch stehen zunächst die rheumatoiden Beschwerden im Vordergrund (Morgensteifigkeit, schubweise Schmerzhaftigkeit vor allem bei Wetterumschwung). Nicht übersehen werden sollte die häufig gleichzeitig auftretende partielle Verknöcherung der Dura mater.

Zur Therapie gilt das zur Arthropathia und Spondylarthropathia gesagte. Auch hier ist die Therapie rein symptomatisch, eine Regeneration ist bei allen angegebenen therapeutischen Maßnahmen nicht zu erwarten. (DÄMMRICH, BRASS, SCHEBITZ 1975; EIKMEIER et. al. 1980; DAHME 1983).

2.2.2.3 Enchondrosis intervertebralis

Die Enchondrosis intervertebralis betrifft im

Gegensatz zu den bisher behandelten degenerativen Gelenkerkrankungen vor allem kleinere, sog. chondrodystrophe Hunderassen. Hierzu gehören insbesondere der Dachshund ("Dackellähme") sowie Beagle, Basset, Spaniel, Pekinese, Pudel usw.

Die Ursache für die vermehrte Anfälligkeit dieser Rassen für Bandscheibenvorfälle ist in einer mangelhaften Ausreifung des Nucleus pulposus (DAHME 1983) bzw. in einem frühzeitig beginnenden Alterungsprozeß des Bandscheibenzentrums (HANSEN 1969) zu suchen.

Die bei anderen Rassen erst im Alter von ca. 7 Jahren beginnende Fibrosierung des Nucleus pulposus mit einer Zunahme von Fibrozyten und kollagenen Fasern beginnt bei den chondrodystrophen Rassen bereits mit 2 bis 7 Monaten und ist oft mit 1 Jahr nahezu abgeschlossen.

Dies ist insofern fatal, als degenerierte Bandscheiben bei einem jungen, lebhaften Hund entsprechend schneller traumatisiert werden können, als bei einem älteren Hund, dessen Bewegungsabläufe etwas langsamer verlaufen (HAVRANEK-BALZARETTI 1980).

Klinisch bemerkbar wird die Enchondrosis intervertebralis erst, wenn der nekrotisierte Nucleus pulposus den geschwächten Anulus fibrosus nach dorsal vorwölbt oder ihn perforiert und in den Wirbelkanal einbricht. Hierbei kommt es zu einer Entzündung vom Fremdkörpertyp, so daß die primäre Schwellung durch die vorgefallenen Massen durch die sekundäre Entzündungsschwellung noch potenziert wird. Die Folgen sind Radiculitis, Parese

oder gar Paralyse durch Quetschung des Rückenmarkes. HANSEN (1969) unterscheidet beim Discusprolaps Typ I, die explosionsartige Extrusion des Detritus in den Wirbelkanal vor allem bei den chondrodystrophen Rassen in jungen Jahren, vom Typ II, der vor allem ältere Tiere (ab 10 Jahren) befällt und bei dem die Folgen, wie oben beschrieben, nicht so dramatisch sind wie bei Typ I. Widersprüchliche Aussagen gibt es darüber, ob die röntgenologisch nachweisbaren Verkalkungen der Zwischenwirbelscheiben Folge oder Ursache des Prolapsus disci sind. (SCHEBITZ, BRASS, DÄMMRICH 1975; HAVRANEK-BALZARETTI 1980; KEALY 1981; MATIS 1983, mündliche Mitteilungen).

Die Diagnose stellt sich anhand der Symptomatik. Die Hunde weigern sich zu springen oder Treppen zu steigen, sie schreien beim Anfassen oder Hochheben oder gar in der Bewegung spontan auf und sind im Rückenbereich hochempfindlich. (SUTER 1984; MÜLLER 1984).

Differentialdiagnostisch müssen Nephritis, Prostatitis und bei Hündinnen vor allem Endometritiden ausgeschlossen werden. Eine Röntgenaufnahme trägt hier wesentlich zur Abklärung bei (MÜLLER 1984). Allerdings sind Verkalkungskerne zwischen den Wirbelkörpern nicht beweisend für einen akuten Vorfall. Selbst Verengungen der Zwischenwirbelräume müssen nicht unbedingt von dem derzeitigen Prolaps herrühren, sondern können Kunstprodukte durch falsche Lagerung oder Folgen starker Muskelverspannung sein. Umgekehrt können echte Verengungen durch das Strecken beim Röntgen geweitet werden (KEALY 1981). Die Diagnose kann als abge-

sichert gelten, wenn echte Lähmungserscheinungen auftreten und die Urin- und Blutuntersuchung andere Krankheiten weitgehend ausschließt. Bei Hündinnen sollte in jedem Fall bei unklarer Anamnese und Diagnose so geröntgt werden, daß Wirbelsäule und vor allem die Gebärmutter gleichzeitig beurteilt werden können. Therapeutisch muß beim akuten Discusprolaps sofort antiphlogistisch eingegriffen werden, um die sekundären Entzündungen zurückzudrängen (MÜLLER 1984).

Die ersten Tage sollte absolute "Käfigruhe" herrschen, später können kurze, aber häufige Rundgänge gemacht werden, um Inaktivitätsatrophien vorzubeugen und um dem Vorfall evtl. ein teilweises, spontanes Zurückgleiten zu ermöglichen (SUTER 1984). Weiterhin wird Vitamin B₁₂ in hohen Dosen, Procainhydrochlorid (Impletol - Bayer) und Entwässerungsmittel zur Dehydrierung des aufgequollenen Fasergewebes empfohlen (MATIS 1983; MÜLLER 1984). Wärmetherapie (Mikrowellenbestrahlung, Heizkissen, Infrarotbestrahlung) wird erst ab dem 5. Tag empfohlen (SUTER 1984), während Magnetfeldbestrahlung vom ersten Tag an von den damit arbeitenden Therapeuten als das Mittel der Wahl bezeichnet wird (MÜLLER 1984; BURGARD 1985). Chirurgisch kann man Discusfensterung, Laminektomie und Hemilaminektomie in Erwägung ziehen. Die Erfolgsaussichten des operativen Eingriffes stehen aber nach wie vor in keinem Verhältnis zum Aufwand und lassen sich auch bis heute statistisch noch nicht rechtfertigen. (SCHEBITZ, BRASS, DÄMMRICH 1975; MÜLLER in SILBERSIEPE/BERGE 1976; HAVRANEK-BALZARETTI 1980; EIKMEIER et.

al. 1980; KEALY 1981; DAHME 1983; MATIS 1983; MÜLLER 1984; SUTER in NIEMAND 1984).

2.3 Zytoplasmatische Therapie

2.3.1 Präparate zur Therapie degenerativer Gelenkerkrankungen

Für die Therapie von degenerativen Gelenkerkrankungen stehen mehrere zytoplasmatische Präparate zur Verfügung, die je nach Diagnose, Lokalisation der Beschwerden und Schwere des Falles einzeln oder in Kombination verabreicht werden können. (KRAFT 1985; WANDERKA 1985; KALBHEN 1985; THEURER, PORCHER, STIEFEL 1985).

Ausgangsmaterial für die zytoplasmatischen Präparate (Revitorgan^R, Fa. vitOrgan, Ostfildern-Ruit) sind ganz allgemein Organe aus gesunden Tierfeten und Jungtieren. Diese werden auf folgende Weise zu sog. Organtrockensubstanzen verarbeitet: Sofort nach der Entnahme wird die Autolyse durch Tiefgefrieren in flüssigem Stickstoff verhindert. Das tiefgefrorene Gewebe wird dann in gekühlten Spezialmøhlen pulverisiert und im Hochvakuum gefriergetrocknet.

Die Artspezifität wird durch Hydrolyse der Zellinhaltsstoffe beseitigt. Dies geschieht durch Begasung mit flüchtigen Säuren. Dabei werden die löslichen molekularen Untereinheiten der Zellbestandteile frei. Die Organspezifität bleibt bei diesem Verfahren erhalten.

Die Organtrockensubstanzen sind zum größten Teil wasserlöslich und Ausgangsmaterial für die Revitorgan^R - Präparationen (PETER 1975).

Folgende Präparationen stehen zur Verfügung:
Revitorgan^R - Lingual: Enthält im Nannogrammbe-
reich gelöste Organtrockensubstanz(en) und z.T.
Arzneimittelzusätze. Die Tropfen werden an den
injektionsfreien Tagen vom Patienten entweder
sublingual oder nasal eingenommen, als Aerosol
inhaliert oder in die Haut eingerieben. Die Dosie-
rung beträgt 2 - 3 x 5 - 10 Tropfen pro Tag.

Revitorgan^R - Dilutionen: Gibt es in den Stärken
I - III. Die Dilutionen werden in ansteigender
Konzentration verabreicht. Die Applikation erfolgt
als Injektion i.c. (Quaddelung), s.c., i.m.,
i.v. oder i.a. sowie als Zusatz zu Infusionen.
Auch die orale, intranasale oder inhalationsmäßige
Verabreichung ist möglich. Man beginnt mit Stärke
I (pg-Bereich), geht dann über zu Stärke II (ng-
Bereich) und Stärke III (µg-Bereich). Dieses Vor-
tasten soll eine immunogene Toleranz beim Patien-
ten erzeugen. Anschließend kann man die Therapie
in absteigender Konzentration fortsetzen und
wieder steigen lassen (sog. Schaukeldosierung)
oder eine sog. "Erhaltungstherapie" mit Stärke
III anschließen. Abschließend werden einmal oder
mehrmals in mehrtägigen bis mehrwöchigen Abständen
die Solpräparate bzw. Trockensubstanzen injiziert:

Revitorgan^R - Sol (Sol = Solubile = Voll löslich):
Enthält 15 mg voll lösliche Trockensubstanz.
Diese wird kurz vor der Injektion mit 2 ml physio-
logischer Kochsalzlösung gelöst und i.m. oder
i.v. injiziert.

Revitorgan^R - Trockensubstanz: Enthält 15 mg Trockenpulver das mit 2 ml physiologischer Kochsalzlösung mit Zusatz von kolloidalen Komplexverbindungen aus Aluminiumhydroxyd und Kieselsäure aufgeschwemmt und i.m. injiziert wird. (Gebrauchsinformation Firma vitOrgan, Ostfildern).

Für die Therapie der degenerativen Gelenkerkrankungen werden folgende Präparate empfohlen (THEUERER; KRAFT; KNECHT; HOFFMANN; KALBHEN; MERTZNICH; LACHNIT; u.a. 1985):

Indikationen für die einzelnen Präparate: (siehe auch KRAFT 1980; KNECHT 1982; FAHMY 1984; LACHNIT 1985; HOFFMANN 1985; WANDERKA 1985).

- NeyArthros^R: Gelenk- und Muskelerkrankungen entzündlicher und degenerativer Art.
(vitOrgan 1986)
- NeyChondrin^R: Erkrankungen des Bewegungsapparates der Wirbelsäule und Gelenke, Osteochondrose, Ischialgien, Neuritiden, rheumatische Erkrankungen.
(vitOrgan 1986)
- NeyNormin^R: Hypergische Diathesen, Atopien, Insuffizienz des Zwischenhirn-Hypophysen-Nebennierensystems, Rheumatismus, vegetative Dystonien, Virusinfekte.
(vitOrgan 1986)
- NeyGeront^R: Vorzeitiges Altern, Impotenz und Alterskrankheiten, Wachstums- und Entwicklungsstörungen, Arteriosklerose, Roborans.
(vitOrgan 1986)
- NeyTroph^R: Muskel- und Nervenerkrankungen.
(vitOrgan 1986)
- NeyCorenar^R: Erkrankungen des Herzens und der Gefäßsysteme.
(vitOrgan 1986)

2.3.2 Durchführung der Therapie

Folgendes Therapieschema wird bei Gelenkerkrankungen vorgeschlagen (vitOrgan 1985):

Behandlungs- tag	REVITORGAN- Dilutionen		REVITORGAN- Trockensubstanzen		REVITORGAN- Lingual			Gegensensibi- lisierung ↓
	73 + 43	63 + 96	47	68	61	65	69	
1.	je 2 ml I + I							intracutan in Quaddein injizieren ↓
2.					3x 5 Tr.			
3.		je 2 ml I + I						
4.						3x 5 Tr.		
5.	je 2 ml I + I							
8.		je 2 ml I + I						
9.							3x 5 Tr.	
10.	je 2 ml I + II							
11.								
12.		je 2 ml I + II						
15.	je 2 ml II + II				usw. an allen			
16.					injektionsfreien			
17.		je 2 ml II + II			Tagen und zur			
18.					Nachbehandlung			
19.	je 2 ml II + III				tgl.			
22.		je 2 ml II + III			3—4 x 5—8 Tr.			
23.					oral			
24.								0,2 ml 10 ⁻¹²
25.								
26.								0,4 ml 10 ⁻¹²
29.								0,2 ml 10 ⁻¹⁰
30.								
31.								0,4 ml 10 ⁻¹⁰
32.								
33.								0,2 ml 10 ⁻⁸
36.								0,4 ml 10 ⁻⁸
37.								
38.								
39.								0,2 ml 10 ⁻⁶
40.								
43.								0,4 ml 10 ⁻⁶
44.								
45.								
46.								
47.								0,2 ml 10 ⁻⁴
50.				2 ml i.m.				0,4 ml 10 ⁻⁴
51.				47 68				
52.				einmal am Ende der				die letzte Dosis
53.				gesamten Kur i.m.				ggfs. mehrfach
54.				injizieren / bei einer				wiederholen
57.				Wiederholungskur				
58.				fortlassen				
59.								
60.								
61.								

Hierbei bedeuten die einzelnen Zahlen:

78 = NeyDesib^R

43 = NeyArthros^R

68 = NeyChondrin^R

96 = NeyTroph^R

47 = NeyDigest^R

61 = FegaCoren^R

65 = NeyNormin^R

69 = AntiFocal^R

I bedeutet Stärke I (10^{-12})

II bedeutet Stärke II (10^{-9})

III bedeutet Stärke III (10^{-6})

Die Gegensensibilisierung ist eine von THEURER Ende der 50iger Jahre entwickelte Modifikation der Eigenblutbehandlung bei der die körpereigenen pathogenen Reaktionsprodukte im Patientenblut außerhalb des Körpers durch ein spezielles Verfahren (Adsorption der Antikörperfraktion an eine kolloidale Komplexverbindung aus Aluminiumhydroxyd und Kieselsäure unter Zusatz von Phenol) zu Antigenen verfremdet werden und nach Reinjektion in steigender Konzentration den Körper zur Bildung spezifischer Antikörper anregen, die dann auch die Autoantikörper eliminieren. Diese Therapie ist unspezifisch im Gegensatz zur Desensibilisierung, bei der Antigene und allergieauslösende Autoantikörper bekannt und vorher ausgetestet sein müssen. (KUGLER, KRUG 1985).

Über die Durchführung der Therapie in der Tiermedizin gibt es unterschiedliche Auffassungen:

Einige Therapeuten führen die Therapie, wie für die Humanmedizin vorgeschlagen, mit den Dilutionen für Stärke I - III mit anschließender Sol-Injektion(nen) durch (KNECHT 1982).

KRAFT (1985) hält die 2 - 3malige Injektion der Dilutions-Stärke II in der Tiermedizin für ausreichend und empfiehlt sie auch aus forensischen Gründen vor Applikation von Trockensubstanz bzw. Sol. Ausnahmen bilden seiner Meinung nach nur Krankheiten mit autoaggressivem Charakter.

SCHLOSSAREK (1985) verzichtet in den meisten Fällen völlig auf die Dilutionsvorbehandlung. Auch MÜLLER (1986) injiziert seit 18 Jahren mit gutem Erfolg Hunden bei bestimmten Hauterkrankungen (symmetrische Alopezie) 5 - 6 Sol- bzw. Trockensubstanzpräparate in einer Sitzung intramuskulär und hat noch nie eine anaphylaktische Reaktion beobachtet.

Nachfolgend einige Behandlungsvorschläge für degenerative Gelenkerkrankungen bei Hunden:

Zyt. Ther	=	Zytoplasmatische Therapie
TS	=	Trockensubstanz
Pred.	=	Prednisolon
Mgf.	=	Magnetfeldtherapie
Impl.	=	Impletol
geb.	=	gebessert
s.c.	=	subcutan
i.m.	=	intramuskulär
i.v.	=	intravenös
i.a.	=	intraartikulär
p.a.	=	paraartikulär (subcutane Quaddelung)
i.c.	=	intracutan
p.v.	=	paravertebral

Über die Bedeutung der Zahlen s.S. 19.

Nr.: _____ Rasse: _____ Geschl.: _____ Alter: _____ b. Beh.-beginn.: _____
Vorbeh. seit: _____
Diagnose: Hüftgelenkdsplasie, Arthropathia _____ Zyt Ther 1 Tag: _____
deformans

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.	geb.
1	II i.a. (p.a.)	43 68 65	83 68 65		X	X	X	
2	II p.a. (i.a.)				X	X	X	
3	II p.a. (i.a.)				X	X	X	
4	II p.a. (i.a.)				X	X	X	
5	II i.a. (p.a.)				X	X	X	
6			2x10 2x10 2x10					
7			2x10 2x10 2x10					
8		2ml i.m. o. i.v.			X	X	X	
9			2x10 2x10 2x10					
10			2x10 2x10 2x10					
11		2ml 2ml 2ml i.m.			X	X	X	
12		o. i.v.	2x10 2x10 2x10					
13			2x10 2x10 2x10					
14		4ml i.m. o. i.v.			X	X	X	
15			2x10 2x10 2x10					
16		usw.	2x10					
17			2x10 2x10					
18			2x10 2x10 2x10					
19			usw.					
20			3 Mon.					

Nr.: _____ Rasse: _____ Geschl.: _____ Alter: _____ b. Beh.-beginn. _____
 _____ Vorbeh. seit: _____
 Diagnose: Polyarthrit. rheumatica Zyt. Ther. Tag: _____

[illegible]

[illegible]

2.3.3 Pharmakologie, Pharmakodynamik, Toxikologie

Pharmakologie:

Die zytoplasmatischen Präparate sind in der pharmakologischen Literatur noch nicht vorgesehen (KUSCHINSKY 1978; FRIMMER 1977). Das deutsche Arzneimittelgesetz (BGB I) erkennt jedoch "Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, -bestandteile und Stoffwechselprodukte von Mensch und Tier in bearbeitetem Zustand" in § 2 als Arzneimittel an. (THEURER 1980). Alle zytoplasmatischen Präparate sind in der Roten Liste aufgeführt (Rote Liste 1986). Die zytoplasmatischen Präparate bestehen aus Proteinen, Nukleinsäuren (RNS, DNS), Lipiden, Polysacchariden, Oligo- und Polypeptiden, Nucleotiden u.a. (THEURER 1980). Zum Teil werden den Dilutionen und Lingual-Präparaten noch Arzneimittel wie Prednisolon u.a. in geringer Konzentration beigelegt (siehe Beschreibung der Inhaltsstoffe S. 32 ff.).

Pharmakodynamik:

Die Wirkungsweise ist noch nicht vollständig abgeklärt. Nachgewiesen ist jedoch ein Organotropismus der Makromoleküle. Wahrscheinlich dienen die zugeführten Zellbestandteile den geschädigten oder nicht mehr funktionierenden Orgazellen zur reparativen Substitution. Dieser Vorgang scheint sich stimulierend auf die anderen Zellen des betroffenen Organes auszuwirken, oder die wiederhergestellten Zellen stellen wieder notwendige Zellbestandteile für die Reparatur gleichartiger Zellen zur Verfügung, so daß die zugeführten Makromoleküle als Initiator einer Kettenreaktion (Schneeballsystem) bezeichnet werden können (THEURER 1980).

Die makromolekularen Organpräparate stimulieren nachgewiesenermaßen die DNA- und RNA-Syntheserate gesunder Zellen und wirken z.T. inhibierend auf entartete (Tumor-)zellen. (PAFFENHOLZ, THEURER 1978).

In umfangreichen in vivo- und in vitro-Versuchen konnte nachgewiesen werden, daß zytoplasmatische Präparate die schädigende Wirkung von Strahlen und Giften auf Organgewebe zu reduzieren vermögen. (BERNS 1962; WIGGE 1975).

MAYR (1985) weist auf die interferonstimulierende Wirkung mancher zytoplasmatischer Präparate hin, die er in mehreren Versuchen nachweisen konnte.

Toxikologie:

Schädliche Nebenwirkungen der zytoplasmatischen Präparate sind in der Literatur bisher nicht beschrieben worden. RÜSSE und KRAFT (1976) weisen auf die Unterschiede zur von der Bundesärztekammer 1976 (D.Ä.H. 27/1976) kritisierten Zellulärtherapie hin, die mit der zytoplasmatischen Therapie nur die Grundsubstanz (Organgewebe) gemeinsam hat. Die Verarbeitung der Organe zu zytoplasmatischen Präparaten hat die Aufspaltung in molekulare Untereinheiten zur Folge, die anaphylaktische Reaktionen und Infektionen seitens der Patienten weitgehend ausschließt.

Die Autoren verweisen auf die im Deutschen Arzneimittelgesetz (BGB I S. 533/1961) vorgesehene Verwendung von Wirkstoffen aus Tierorganen wie Hormone, Enzyme, u.a..

Nachfolgend werden Untersuchungen und Berichte aufgeführt, die sich speziell mit den in dieser Arbeit zu beschreibenden Wirkungen von NeyArthros^R und NeyChondrin^R befassen:

SCHLOSSAREK (1975 - 1986) berichtet über mehrere Fälle von Arthropathia deformans bei Hunden, die er mit zytoplasmatischen Präparaten erfolgreich behandeln konnte.

KRAFT (1976 - 1980) empfiehlt für degenerative Erkrankungen an Gelenken und Wirbelsäule die Präparate NeyArthros^R und NeyChondrin^R, wobei er auch die Verwendung der NeyArthros^R-Dilution zur i.a.-Injektion beschreibt.

HOFFMANN (1978 - 1985) weist in einer Langzeitstudie mit jährlich wachsender Patientenzahl (zuletzt 440 Humanpatienten) die positive Wirksamkeit der zytoplasmatischen Therapie bei chronischer Polyarthritits nach. In den 7 Jahren der Studie ist kein Patient in ein schlechteres Stadium abgesunken, röntgenologisch ließ sich keine Progredienz mehr nachweisen. Bei 24 % der Patienten, die sich bereits im Stadium IV (siehe S. 8) der Beschwerden befanden, konnte noch eine völlige Schmerz- und Medikamentenfreiheit bewirkt, bei weiteren 52 % konnte die Funktion der Gelenke gebessert und eine Reduzierung der Antirheumatika erreicht werden.

BARTHOLD (1978 - 1985) berichtet in mehreren Publikationen über positive Erfahrungen mit NeyArthros^R und NeyChondrin^R.

HOFFMANN (1979) injizierte 56 Humanpatienten

mit Monarthrititis und Monarthrosis NeyArthros^R-Dilutionen intraartikulär und bezeichnet die Ergebnisse als beeindruckend.

ARTMEIER und KÜHN (1981) werteten 53 Dackellähmefälle aus einem Zeitraum von 5 bis 8 Jahren aus, die mit zytoplasmatischer Therapie behandelt worden waren. Alle Patienten wurden zunächst der üblichen Therapie (Antiphlogistika, Prednison, Vitamine und Ruhigstellung) unterzogen und bekamen erst zytoplasmatische Präparate injiziert, wenn der Behandlungserfolg ausblieb. Von den 53 beobachteten Patienten erlitten 21 nach 8 Monaten ein Rezidiv, 32 Fälle zeigten einen chronischen Verlauf. Die Hunde waren zunächst mit 9 Dilutions-Injektionen der Stärke II im Abstand von 3 Tagen und dann mit 1 Trockensubstanz-Injektion behandelt worden. In einigen Fällen wurden Dilutions-Injektionen wöchentlich wiederholt.

WEH, DAHMEN und FRÖSCHLE (1981) untersuchten verschiedene intraartikulär applizierbare Pharmaka auf ihren Einfluß auf die mechanischen Gelenkknorpel Eigenschaften in vitro. Die Gelenkknorpelproben von Operationsmaterial wurden vor und nach Inkubation mit Nährlösung (HANK'sche Lösung) und Pharmakon auf ihre Kugeldruckhärte hin untersucht. "Abgesehen von einem Kortikoidpräparat (Diprosone^R-Depot, Byk-Essex) konnte bei allen anderen Medikamenten (Dona^R200 S, Opfermann Arzneimittel; Arteparon^Rforte, Luitpold-Werke; NeyArthros^R, vit-Organ GMBH; Zeel^R, Heel) eine Erhöhung der Eindringtiefe bezogen auf die Vergleichsserie beobachtet werden. Der deutlichste Effekt war bei NeyArthros^R festzustellen."

KLÜMPER (1983) stellte fest, daß sich nach intraartikulärer Injektion von NeyArthros^R-, NeyChondrin^R- und NeyChondrin^R-"-N"-Dilutionen in 5000 Fällen die Zeit bis zur beschwerdefreien Funktions- und Belastungsfähigkeit traumatisierter Gelenke um bis zu 30 % verkürzte, während die Injektionsintervalle um bis zu 50 % verlängert werden konnten. Die besten Erfolge wurden mit NeyChondrin^R-"-N"-Dilution der Stärke I erzielt. Er kommt zu dem Schluß, "daß die intraartikulär applizierten zytoplasmatischen Substanzen offensichtlich zu einer Besserung des geschädigten Gelenkknorpels, zu seiner Stabilisierung und letzten Endes morphologischen Regeneration, in welchem Umfang auch immer, beitragen".

WANDERKA (1983) beobachtete die Regeneration von Knorpelgewebe unter dem Einfluß von intraartikulär appliziertem NeyArthros^R und NeyChondrin^R in Kombination mit perkutan (über einen therapeutischen Pflasterverband) gegebenen NeyGeront^R in vivo an 3 Pferden. Diesen wurde für eine spezielle phototechnische Beobachtung der Heilungsvorgänge über je 1 Kniegelenk eine Fensterfistel angelegt. In einem anderen Versuch konnte er an vorgeschädigten Wirbelsäulen von Ferkeln nach 6wöchiger Therapie eine im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant fortgeschrittene Wirbelsäulenreparation mit Aufbau der Zwischenwirbelkörper nachweisen.

LACHNIT (1983) bezeichnet die Therapie mit NeyChondrin^R und NeyArthros^R bei arthrotischen Veränderungen im Alter nach dem Ergebnis einer Doppelblindstudie an Menschen in einem Pflegeheim der

Stadt Wien als Therapie der Wahl.

FAHMY (1984) konnte in einer Doppelblindstudie (90 Patienten) nachweisen, daß die Rheumafaktoren bei der Verumgruppe (NeyThymun^R + NeyChondrin^R + NeyArthros^R) nach 2 Wochen schnell abnahmen, während in der Placebogruppe der Titer fast unverändert blieb. Die Hyaluronatkonzentration in der Synovialflüssigkeit (10 Patienten) erhöhte sich langsam bei der Verumgruppe und blieb bei der Placebogruppe unverändert.

WANDERKA (1985) setzte eine Kontroll- und Verumgruppe von je 100 tropischen Brackwasserkrabben einer Umstellung an Süßwasser aus. Die Kontrollgruppe wurde mit handelsüblichen Futtermitteln gefüttert, die Verumgruppe erhielt zusätzlich pro Tier und Tag 0,05 ml einer Gesamtlösung aus NeyChondrin^R, NeyArthros^R und NeyGeront^R. Nach 2 Jahren hatten nur 23 Krabben der Kontrollgruppe überlebt, während es in der Verumgruppe 87 Tiere waren.

Ebenso erging es 70 tropischen Wasserschildkröten von denen in der Kontrollgruppe fast die Hälfte, in der Verumgruppe jedoch nur 9 Tiere innerhalb von 2 Jahren verendeten.

KALBHEN und MERTZNICH (1985) konnten in einer an 40 Legehennen durchgeführten Doppelblindstudie mit wöchentlichen intraartikulären Injektionen von NeyChondrin^R über eine 10wöchige Versuchsdauer durch regelmäßige Gelenkspaltmessung und quantitative Erfassung der röntgenologischen und makroskopischen Befunde eine "deutliche Verminderung der Progredienz und Intensität degenerativer Prozesse in den betroffenen Kniegelenken (der)

Versuchstiere" nachweisen. Vor Therapiebeginn war bei allen Tieren eine Gonarthrose mit intraartikulärer Injektion an 2 aufeinanderfolgenden Tagen von 0,5 mg Monojodacetat gelöst in 0,1 ml physiologischer Kochsalzlösung ausgelöst worden.

3 EIGENE UNTERSUCHUNGEN

3.1 Material

Die Untersuchungen wurden an 53 Patienten der tierärztlichen Klinik Dr. Wilfried MÜLLER in Wuppertal vorgenommen.

3.1.1 Therapie

Folgende Medikamente bzw. therapeutische Maßnahmen kamen zur Anwendung:

Wedecort^R (WDT, Hannover): 1 ml wässrige Suspension enthält: 25 mg Prednisolon-21-acetat.

Hostacortin^R (Hoechst Veterinär GmbH, Unterschleißheim):

1 ml Kristallsuspension enthält: 10 mg Prednisolon-21-acetat.

Medivitan^R (Medice, Iserlohn): 1 Ampulle (I+II) enthält:

2000 μ g Cyanocobalamin (B₁₂-Cyanokomplex)

1000 μ g Hydroxocobalamin (B₁₂-Depot)

1,1 mg folsaures Natrium

15 mg Nicotinamid

5 mg Pyridoxiniumchlorid (B₆-Hydrochlorid)

89 mg Ascorbinsäure

15 mg Aneurinchloridhydrochlorid

24 mg Lidocainhydrochlorid.

Vitamin B₁₂ (Friesoythe, Burgwedel): 1 ml enthält:

1000 μ g Vitamin B₁₂-Cyanokomplex.

Impletol^R (Bayer, Leverkusen): 2 ml (1 Ampulle) enthalten:

40 mg Procainhydrochlorid

28,4 mg Coffein.

Lasix^R (Hoechst AG, Frankfurt a.M.): 2 ml (1 Ampulle enthält:

21,3 mg Furosemid-Natrium.

Arumalon^R (Robapharm GmbH, Badenweiler): 1 ml Lösung enthält:

0,4986 ml Extr. aquos. ex 25 g Cartilago sternocostalis

0,4986 ml Extr. aquos. ex 0,15 g Medulla ossis rubra

0,0028 ml m-Kresol.

Butazolidin^R-Dragees (Ciba-Geigy GmbH, Wehr)

1 Dragee enthält:

200 mg Phenylbutazon.

Delta-Butazolidin^R-Dragees (Ciba-Geigy GmbH, Wehr)

1 Dragee enthält:

50 mg Phenylbutazon

1,25 mg Prednison.

Arthri-Dog (Selecta vet., Dr. Otto Fischer, München): 1 Tablette enthält:

100 mg Phenylbutazon-Calcium

0,2 mg Prednisolon-21-acetat

100 mg Ascorbinsäure.

NeyCorenar-Sol (vitOrgan GmbH, Ostfildern) enthält:
Cor fetalis.

NeyCorenar-Dilutionen enthalten zusätzlich:

Na-dodecylsulfat.

NeyArthros-Sol (vitOrgan GmbH, Ostfildern) enthält:
Cartilago articuli, Synovia, Articuli fetales.

NeyArthros-Dilutionen enthalten zusätzlich:

Na-dodecylsulfat.

NeyArthros-Liposome (vitOrgan GmbH, Ostfildern)
(Tropfen) enthalten zusätzlich:

Thymus fetalis, Funiculus umbilicalis, Metenolonacetat, Prednisolon-21-acetat, Glucose-Monohydrat, Lipidextrakt aus Cartilago articuli, Synovia und Articuli fetales, Zinksulfat, Mangansulfat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, inkorporiert in Liposomen aus: Lecithin und Cholesterin, suspendiert in einer Lösung aus: Thymus fetalis, Columna vertebralis fetalis, Capsula articuli fetalis, Articuli fetales, Musculi fetales, Glandula suprarenalis.

NeyGeront-Sol (vitOrgan GmbH, Ostfildern) enthält: Embryo totalis, Placenta, Amnion, Funiculus umbilicalis, Cor, Ren, Pankreas, Mucosa intestinalis, Lien, Thymus juvenilis, Glandula suprarenalis, Glandula parathyreoidea, Testes juveniles, Hypophyse totalis, Diencephalon, Cortex cerebri.

NeyGeront-Dilutionen enthalten zusätzlich:
Na-dodecylsulfat.

NeyGeront-Dilutionen "N" enthalten zusätzlich: Heparin, ~~α~~-Tocopherolacetat (Vit. E), Cyanocobalamin (Vit. B 12), Pyridoxin-HCL (Vit. B 6), Metenolonacetat, Liothyronin-HCL, Procain-HCL.

NeyGeront-Tropfen enthalten zusätzlich:
Glycerin und physiologische Natriumchloridlösung.

NeyNormin-Sol (vitOrgan GmbH, Ostfildern) enthält: Thymus fetalis, Glandula suprarenalis, Lymphonodi, Glandula parathyreoidea, Hepar, Ren, Pankreas, Lien, Vasae fetales, Funiculus umbilicalis, Hypophyse totalis, Diencephalon, Mucosa miscae, Cutis, Medulla ossium.

NeyNormin-Dilutionen enthalten zusätzlich:

Na-dodecylsulfat.

NeyNormin-Dilutionen "N" enthalten zusätzlich:

Prednisolon-21-acetat, Liothyronin-HCL, Oestra-
diolbenzoat, Gonadotropinum chorionicum, α -Toco-
pherolacetat (Vit. E-acetat), Cyanocobalamin (Vit.
B 12).

Ney-Normin-Tropfen enthalten zusätzlich:

Glycerin und physiologische Natriumchloridlösung.

NeyChondrin-Sol (vitOrgan GmbH, Ostfildern) ent-
hält:

Thymus fetalis, Hypophyse, Diencephalon, Medulla
spinalis, Glandula suprarenalis, Testes juveniles,
Hepar, Pankreas, Musculi, Columna vertebralis fe-
talis, Articuli fetales, Ren, Placenta, Nucleus
pulposus.

NeyChondrin-Dilutionen enthalten zusätzlich:

Na-dodecylsulfat.

NeyChondrin-Dilutionen "N" enthalten zusätzlich:

Metenolonacetat, Prednisolon-21-acetat, α -Toco-
pherolacetat (Vit. E-acetat), Procain-HCL.

NeyChondrin-Tropfen enthalten zusätzlich:

Glycerin und physiologische Natriumchloridlösung.

NeyTroph-Sol (vitOrgan GmbH, Ostfildern) enthält:

Musculi juveniles, Musculi fetales, Cor fetalís,
Thymus, Medulla spinalis, Cortex cerebri, Epiphy-
se, Diencephalon.

NeyTroph-Dilutionen enthalten zusätzlich:

Na-dodecylsulfat.

NeyTroph-Tropfen enthalten zusätzlich:

Glycerin und physiologische Natriumchloridlösung.

Magnetfeldtherapie wurde mit dem Gerät "Magnet-
tron" (elecsystem GmbH, Heidenrod/Kemel) durchge-
führt.

3.1.2 Diagnosen

Es wurden nur Patienten mit folgenden diagnostizierten Krankheiten für diese Arbeit ausgewählt:

1. Primäre und sekundäre Arthropathia deformans (29 Hunde)
2. Spondylopathia deformans oder Spondylarthropathia deformans (7 Hunde)
3. Enchondrosis intervertebralis (17 Hunde)

3.1.3 Alter

Die Altersverteilung sah zu Beginn der Untersuchungen folgendermaßen aus:

bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jahre
Anzahl	3	1	5	5	6	8	3	7	3	5	2	1	4	Hunde

3.1.4 Rassen

Die Rassezugehörigkeit verteilt sich wie folgt:

Rauhhaardackel	9
Langhaardackel	7
Pudel	1
Cockerspaniel	1
Beagle	1
Kleine Münsterländer	2
Golden Retriever	1
Boxer	5
Collis	3
Irische Setter	3
Deutsche Schäferhunde	15
davon 3 DSH-Mischlinge	

Deutsche Doggen	1
Neufundländer	1
Berner Sennenhund	1
Leonberger	1
Landseer	1

3.1.5 Therapiearten

Für die Therapiearten innerhalb der zytoplasmatischen Therapie wurden folgende Präparationen verwendet:

Lingual-Präparate (s.S.16)

Dilutions-Präparate der Stärken I, II und III (s.S. 16)

Sol-Präparate (s.S.16)

3.1.6 Geschlecht

37 Hunde waren männlichen, 16 Hunde weiblichen Geschlechtes.

3.1.7 Statistik

Die statistische Auswertung wurde mit Hilfe des Computers der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal am Fachbereich Mathematik durchgeführt.

3.1.8 Laboruntersuchungen

Die Laboruntersuchungen wurden, wenn nicht anders angegeben, im Labor der tierärztlichen Klinik Dr. Wilfried MÜLLER in Wuppertal durchgeführt.

3.2 Methodik

Die Untersuchungen wurden von Januar 1985 bis zum Stichtag 31. März 1986 vorgenommen. Die Auswahl der Patienten erfolgte weitgehend zufällig, wenngleich folgende praktische Gesichtspunkte eine Rolle spielten:

1. Unbefriedigende Vorbehandlung.
2. Stammpatienten mit zuverlässigen Besitzern, die auch ein häufiges Erscheinen in der Klinik nicht scheuten.
3. Möglichst viel Patientenmaterial zu Beginn der Untersuchungen um längerfristige Werte zu erhalten.

Wegen der überraschend guten Ergebnisse wurde die zytoplasmatische Therapie auch bei anderen Patienten angewandt, die dann (alle) nachträglich in die Untersuchung mit hineingenommen wurden (auch aus 1984).

45 Hunde waren wegen desselben Leidens (Diagnosegruppe 1 oder 2) bereits vorbehandelt, überwiegend am Untersuchungsort (tierärztliche Klinik Dr. Wilfried MÜLLER, Wuppertal), so daß sich die verschiedenen Therapieformen anhand dieser Patienten besonders gut vergleichen lassen. Zum Vergleich wurden folgende Therapieformen gegenübergestellt:

Therapie "A":

Die Medikamente und Maßnahmen mit denen diese 45 Patienten vorbehandelt wurden wird retrospektiv bewertet und als Therapie "A" bezeichnet:

Hierbei kamen folgende Präparate und Methoden zur Anwendung:

Wedecort (s.S. 31)

Hostacortin (s.S. 31)

Medivitan (s.S. 31)

Vitamin B₁₂ (s.S. 31)

Arumalon (s.S. 32)

Impletol (s.S. 31)

Lasix (s.S. 32)

Butazolidin-Dragees (s.S. 32)

Deltabutazolidin-Dragees (s.S. 32)

Arthri-Dog (s.S. 32)

Magnetfeldtherapie (s.S. 34)

Therapie "B":

Die Behandlung mit zytoplasmatischen Präparaten wird im folgenden mit Therapie "B" bezeichnet: Folgende zytoplasmatische Präparate kamen zur Anwendung:

NeyArthros, NeyChondrin, NeyNormin, NeyGeront und NeyCorenar (sämtlich von der Firma vitOrgan GmbH, Ostfildern). Über die Inhaltsstoffe s.S. 32 ff..

Ferner die Präparate:

Medivitan (s.S. 31)

Vitamin B₁₂ (s.S. 31)

Impletol (s.S. 31)

Lasix (s.S. 32)

und die Magnetfeldtherapie (s.S. 34).

3.2.1 Therapiegruppen

Die Patienten wurden je nach Diagnose in zunächst

2, später 3 Therapiegruppen eingeteilt. Gruppe 1 erhielt eine Therapie mit NeyArthros, Gruppe 2 wurde mit NeyChondrin behandelt. Für Fälle, die sich nur unbefriedigend besserten, für Patienten mit Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, für Hunde mit besonders starken Beschwerden und für Patienten, deren Besitzer eine besonders intensive Therapie wünschten, wurde schließlich noch eine Therapiegruppe 3 eingerichtet, in der die Hunde mit NeyArthros und NeyChondrin behandelt wurden.

Therapiegruppe 1: 22 Hunde erhielten ausschließlich Injektionen mit NeyArthros,

Therapiegruppe 2: 15 Hunde ausschließlich mit NeyChondrin und

Therapiegruppe 3: 16 Hunde bekamen nacheinander oder gleichzeitig NeyArthros und NeyChondrin injiziert weil

- a) sie sich nicht zufriedenstellend besserten oder weil
- b) von vorneherein Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen diagnostiziert wurden oder weil
- c) die Schwere des Falles eine Erweiterung der Therapie ratsam erscheinen ließ oder weil
- d) die Besitzer den Einsatz aller therapeutischen Möglichkeiten wünschten.

Um die Ergebnisse differenzierter auswerten zu können, wurden die Tiere außerdem mehrmals verschiedenen Gruppen zugeordnet. Die Gruppen wurden für die Auswertung zusammengestellt nach Diagnose, Alter, Rasse, Therapieart und Geschlecht.

3.2.2 Diagnosegruppen:

Die Patienten wurden grundsätzlich vor Beginn einer Therapie klinisch untersucht, sowie auf Schmerzhaftigkeit in den Gelenken überprüft. Von 38 Hunden wurden auch Röntgenaufnahmen angefertigt. Bei den anderen Patienten wurden auf Wunsch der Besitzer keine Aufnahmen gemacht (Narkose, wirtschaftliche Gründe). Von den 53 Patienten litten:

Gruppe 1A: 29 Hunde (54,72 %) unter primärer oder sekundärer Arthropathia deformans, davon 2 in Kombination mit leichter Hüftgelenkdysplasie und 1 in Kombination mit Spondylarthropathia deformans. 15 dieser Hunde litten unter mittlerer bis schwerer Hüftgelenkdysplasie mit sekundärer Arthropathia deformans, davon 2 in Kombination mit Spondylarthropathia deformans.

Gruppe 2S: 7 Hunde (13,21 %) unter Spondylo- oder Spondylarthropathia deformans, davon 3 in Kombination mit Hüftgelenkdysplasie.

Gruppe 2E: 17 Hunde (32,07 %) unter Enchondrosis intervertebralis, davon 1 in Kombination mit Arthropathia deformans.

Wegen der Zusammenhänge in Morphologie, Kausalität und Symptomatik wurden die Gruppen 2S + 2E für die Auswertung zusammengefaßt. Größere Gruppen ergeben objektivere Bilder.

Manche Patienten der Diagnosegruppe 1 litten zusätzlich unter Spondylopathia bzw. Spondylarthropathia deformans, was sich allerdings erst im Laufe der Zeit herausstellte. Ursprünglich

war vorgesehen, die Gruppen und ihre Therapie scharf zu trennen. So sollte die Gruppe 1 ausschließlich mit dem Präparat NeyArthros, die Gruppe 2 ausschließlich mit NeyChondrin behandelt werden. Dies ließ sich nach veränderter Diagnoselage nicht mehr aufrecht erhalten. Daß die Diagnosen teilweise unvollständig waren, stellte sich bei manchen Tieren aufgrund des unbefriedigenden Therapieerfolges heraus. Erst nach Wechsel des Präparates oder zusätzlicher Verabreichung des anderen Präparates trat bei den meisten dieser Hunde der Therapieerfolg ein. Bei anderen Patienten, die erst im nachhinein in diese Arbeit aufgenommen wurden, ist die Therapie von vorneherein mit beiden Präparaten gleichzeitig vorgenommen worden. Stellten sich innerhalb des Untersuchungszeitraumes andere Beschwerden ein, so wurden diese auch weitgehend mit zytoplasmatischen Präparaten behandelt.

3.2.3 Altersgruppen

Gruppe 1: 20 Hunde (37,74 %) waren bei Behandlungsbeginn (Therapie B) jünger als 6 Jahre.

Gruppe 2: 21 Hunde (39,62 %) im Alter zwischen 6 und 10 Jahren.

Gruppe 3: 12 Hunde (22,64 %) über 10 Jahre alt.

3.2.4 Rassegruppen

Gruppe 1: 16 Hunde (30,19 %) gehörten einer kleinen Rasse (Dachshunde) an (bis 12 kg).

- Gruppe 2: 6 Hunde (11,32 %) waren mittelgroß (Pudel, Spaniel, Beagle, kleiner Münsterländer) (bis 25 kg).
- Gruppe 3: 26 Hunde (49,01 %) gehörten zu einer großen Rasse (Golden Retriever, Boxer, Setter, Collie, Deutscher Schäferhund) (bis 40 kg).
- Gruppe 4: 5 Hunde (9,43 %) waren einer schweren Rasse (Dogge, Neufundländer, Berner Sennenhund, Leonberger, Landseer) (über 40 kg) zuzuordnen.

3.2.5 Therapieart

Bei 42 Patienten wurde die Therapie so durchgeführt, wie es von der Firma vitOrgan vorgeschlagen wird, d.h. diese Patienten erhielten zunächst an 5 Tagen je 1 Injektion von 2 ml Dilution (Ney Arthros oder NeyChondrin) und anschließend 1 - 2mal je 1 Ampulle der entsprechenden Sol-Präparation. 1 Patient erhielt nur 5 Dilutionsinjektionen; 10 Hunde bekamen ausschließlich ein- oder mehrmals die Sol-Präparationen injiziert. 11 Hunden wurde vor Beginn der Dilutionsbehandlung ein- oder zweimal die Sol-Präparation injiziert. Nach der Dilutionsserie erhielten 10 dieser Hunde dann noch einmal 1 - 2mal das entsprechende Sol-Präparat injiziert.

Gruppe 1: 12 Tiere (22,64 %) erhielten nur 1 - 2mal Sol-Präparate injiziert, davon 2 nur NeyArthros-Sol, 6 nur NeyChondrin-Sol und 4 NeyArthros und NeyChondrin-Sol.

Gruppe 2: 1 Hund (Nr. 7) bekam nur NeyArthros-Dilutionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen injiziert.

Gruppe 3: 17 Patienten (32,07 %) wurde 5mal je 2 ml Dilution und anschließend 1x1 Ampulle (2ml) Sol injiziert. Dies waren in der NeyArthros-Gruppe 9, in der NeyChondrin-Gruppe 1 und in Therapiegruppe 3 7 Patienten.

Gruppe 4: 13 Hunde (24,53 %) erhielten nach den 5 Dilutions-Injektionen noch zwei- oder mehrmals Sol-Präparate. In Therapiegruppe 1 waren dies 6, in Gruppe 2 4 und in Gruppe 3 3 Patienten.

Gruppe 5: 10 Hunden (18,87 %) wurde zunächst 1-2mal ein Sol-Präparat injiziert und anschließend oder etwas später noch einmal eine Kur mit Dilutionen und anschließenden Sol-Injektionen durchgeführt. 4 Patienten hiervon gehörten zur Therapiegruppe 1, 4 zur Gruppe 2 und 2 Patienten gehörten zur Therapie-Gruppe 3 (NeyArthros + NeyChondrin).

3.2.6 Geschlechtergruppen

Gruppe 1: 37 Hunde (69,81 %) waren männlichen,

Gruppe 2: 16 Hunde (30,19 %) weiblichen Geschlechts.

3.2.7 Vergleichende Bewertung Therapie A -Therapie B

3.2.7.1 Statistische Auswertung

Für die statistische Auswertung wurden der Vorzeichentest und der Wilcoxon-Rang-Test angewandt. Der Zustand der Patienten wurde mit folgenden Noten bewertet:

Bewertungsschema:

Am Bewertungszeitpunkt haben sich die Beschwerden im Vergleich zum Ausgangsbefinden (Tag A1 oder B1)

+ 4 = hochgradig gebessert; kein Schmerz auslösbar; Allgemeinbefinden: Auffallend munter.

+ 3 = hochgradig gebessert; Schmerzen geringgradig auslösbar; lahmt selten nach Aufstehen oder Belastung (z.B. bei Wetterwechsel); kann (wieder) hochspringen, Treppen steigen.

+ 2 = mittelgradig gebessert; lahmt nach Aufstehen oder Belastung.

+ 1 = geringgradig gebessert (oder: nur Allgemeinbefinden hochgradig gebessert).

0 = unverändert (oder: wieder Beschwerden).

- 1 = geringgradig verschlechtert.

- 2 = mittelgradig verschlechtert.

- 3 = hochgradig verschlechtert.

- 4 = hochgradig verschlechtert + Allgemeinbefinden verschlechtert.

Die Bewertung erfolgte durch die Ärzte der tierärztlichen Klinik Dr. Wilfried MÜLLER, Wuppertal, die Bewertung durch die Tierbesitzer sah in vielen Fällen positiver aus (siehe Gesamtübersicht S. 95 , Spalte 22 b) da diese selten beurteilen

können, ab an einem Gelenk noch Schmerzen auslösbar sind oder nicht. Wurde die endgültige Bewertung vom Tierhalter telephonisch durchgegeben, wurde bei der Bewertung automatisch ein Punkt abgezogen.

Vergleichende Bewertungen wurden vorgenommen am 100. und 180. Tag sowie am 31.03.1986 (Stichtag: Ende der Untersuchung) bzw. Todestag (= Tag E) für Therapie B. Therapie A kann für den vergleichbaren Tag (letzter Tag vor Beginn Therapie B) für eine vergleichende Beurteilung nur bedingt herangezogen werden, da in den meisten Fällen ja gerade der schlechte Zustand des Patienten Grund für einen Wechsel zu Therapie B war.

Für die statistische Auswertung wurden außerdem noch, soweit möglich, Beurteilungen am 10., 30., 60., 90., 120., 150., 180., 210., 240., 270., 300., 330. und 360. Tag vorgenommen.

Für diese Tage wurden auch die bis dahin angefallenen Rezidive festgehalten. Als Rezidive wurden nur solche anerkannt, die eine Behandlung unbedingt notwendig erscheinen ließen.

Da nach Literaturangaben (THEURER 1985) ein Therapieerfolg auch noch nach 3 Monaten auftreten kann, wurde die Beobachtung der Patienten, deren Besitzer eine weitere Behandlung ablehnten, nach 100 Tagen beendet (= Tag E).

Die Patienten, die sich unter der Therapie nicht gebessert haben, sowie die Patienten, die innerhalb des Untersuchungszeitraumes gestorben sind, bzw. getötet wurden, werden im Rahmen der Fallbeschreibungen besprochen.

Prozentzahlen werden nur für Patientenzahlen $n > 5$ ausgewiesen. Die Zufallswahrscheinlichkeit ist für kleinere Zahlen zu groß.

Vergleichende Bewertung Therapie A - Therapie B

Die Ergebnisse der zytoplasmatischen Therapie (Therapie B) werden mit den Ergebnissen der Vorbehandlung (Therapie A) verglichen. Bei der Auswertung werden vor allem subjektive Befunde registriert. Die Fragestellung lautet dann: Hat sich der Zustand des Patienten im Endeffekt verbessert, verschlechtert, oder ist er unverändert geblieben?

Für den tabellarischen Vergleich beider Therapiearten wurde der Zustand der Patienten am 100. und 180. Tag bewertet. Der Vollständigkeit halber wird auch der Zustand am Tag E bewertet. Dies ist jedoch nur für Therapie B aussagekräftig, da, wie gesagt (s.S. 45), Tag E bei Therapie A in den meisten Fällen der Tag ist, an dem man sich zur Weiterbehandlung mit Therapie B entschlossen hat, weil Therapie A zu keinem dauerhaften Behandlungserfolg führte. Allerdings läßt das Ergebnis eine Aussage darüber zu, ob Patienten, die mit Therapie A "ausbehandelt" worden sind, mit Therapie B evtl. eine Chance haben, sich doch noch zu bessern.

Statistisch wird dann noch der jeweilige Zustand und die Anzahl der Rezidive am/zum 30., 60., 90., 100., 120. und 180. Tag ausgewertet. Hierfür bedienen wir uns des Vorzeichen- und des Wilcoxon-Rang-Testes. Für beide Tests werden die Be-

wertungen an den entsprechenden Tagen gegenüber gestellt und die Differenzen gebildet. Für den Vorzeichentest wird nur die Anzahl der positiven und negativen Ergebnisse berücksichtigt. Beim Wilcoxon-Rang-Test gehen auch die Bewertungsunterschiede in die Berechnung ein.

Die Unterschiede beider Therapiearten sind signifikant, wenn $p \leq 0,05$ ist.

3.2.8 Laboruntersuchungen

Bei 21 Patienten (39,62 %) wurde vor der ersten und nach der letzten Injektion der ersten Injektionsserie und zum Teil auch vor und nach weiteren Injektionen Blut zur Untersuchung entnommen. Folgende Parameter und Enzymaktivitäten kamen dabei zur Auswertung (nicht jeder Parameter bei jedem Hund):

Erythrozytenzahl (HC 222, Clinicon, Mannheim)

Leukozytenzahl (HC 222, Clinicon, Mannheim)

Blutkörperchensenkung (Methode Westergren)

Harnstoff (Merckognost)

Creatinin (Photometer-Farbstest, Bio-dynamics)

Aktivität der:

Alkalischen Phosphatase (AP)

Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT)

Glutamat-Oxalazetat-Transaminase (GOT)

Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)

Lactat-Dehydrogenase (LDH)

γ -Glutamyl-Transferase (γ -GT)

Lipase

(AP, GPT, GOT, GLDH, LDH, γ -GT, Lipase: alle Photometer, Monotest, Boehringer, Mannheim)

Glucose (Photometer, Gluco-quant, Hexokinase-Methode, Boehringer, Mannheim)

Gesamteiweiß (Refraktometer)

Calcium- und Phosphorgehalt des Blutes wurden am staatlichen Veterinäruntersuchungsamt in Krefeld bestimmt.

Urinuntersuchungen wurden mit dem Combur-9-Teststreifen (Boehringer, Mannheim), Steril-Urinbebrütungen mit Uricult^R (Boehringer, Mannheim) durchgeführt.

3.3 Ergebnisse

Insgesamt wurden 53 Fälle ausgewertet. Nr. 12 (s. Spalte 1 der Gesamtübersicht S.94) erhielt nur einmal 1 Injektion Prednisolon 50 mg und gleichzeitig 1 Injektion 50 mg NeyArthros-Sol. Danach wurde der Hund nur noch mit Prednisolon behandelt. Deshalb wurde er aus der Bewertung wieder herausgenommen.

3.3.1 Therapiegruppen

Gruppe 1: NeyArthros

Am 100. Tag (s. Tabelle 1) können 25 Patienten (47,17 %) beurteilt werden. Bei 24 Patienten (96 %) haben sich die arthro- und discopathischen Folgebeschwerden gebessert, 1 Hund zeigt keine Besserung (Nr. 23 aus Spalte 1 der Gesamtübersicht). Für diesen Hund lehnt der Besitzer jede weitere Therapie ab (s.S. 112). 2 Hunde zeigen hochgradige Besserung der Beschwerden und des Allgemeinbefindens, d.h. diese Hunde wurden munte-

rer und fraßen wieder besser (Nr.1 und 27), 17 Hunde (68 %) hochgradige Besserung der Beschwerden und 5 Hunde (20 %) haben sich bis zu diesem Tag mittelgradig gebessert.

Am 180. Tag (s. Tabelle 2) können in Gruppe 1 21 Patienten (39,62 %) beurteilt werden. 19 Patienten (90 %) haben sich gebessert, davon 17 (80,95 %) hochgradig, von diesen zeigen 2 (Nr. 1 + 11) auch auffallende Verbesserung des Allgemeinbefindens. 2 Hunde sind in ein schlechteres Stadium abgerutscht (Nr. 15 + 24, s.S. 107 und S. 95) und werden in Gruppe 3 weiterbehandelt. Nr. 21 ist vorher in ein schlechteres Stadium gekommen und bereits in Gruppe 3 weiterbehandelt worden. Für Nr. 23 ist die Beobachtung nach dem 100. Tag beendet, da der Besitzer eine weitere Behandlung ablehnt (s.S.112).

Für die Beurteilung an Tag E (31.03.1986 bzw. Todestag bzw. 100.Tag) bei den Patienten, deren Besitzer eine weitere Therapie ablehnen; (s. Tabelle 3), stehen 22 Patienten (41,51 %) zur Verfügung. Von diesen haben sich 21 (95,45 %) gebessert, davon 17 (77,27 %) hochgradig, hiervon zeigen 2 Patienten nach wie vor auffallenden Bewegungs- und Spieltrieb (Nr. 1 + 11). Bei dem Patienten, der sich nicht gebessert hat, handelt es sich weiterhin um die Nr. 23 (s. 100. Tag).

Gruppe 2: NeyChondrin

Am 100. Tag (s. Tabelle 1) können 14 Patienten (26,42 %) beurteilt werden. Bei 13 dieser Patienten (92,86 %) haben sich die Beschwerden gebessert, bei 12 (85,71 %) hochgradig. 2 Hunde zeigen

zusätzlich auffallende Besserung des Allgemeinbefindens (Nr. 44 + 45). 1 Hund zeigt lediglich Besserung des Allgemeinzustandes bei Verminderung der Schmerzempfindlichkeit; die Paralyse der Hinterhand ist unverändert geblieben (Nr. 36, s.S.117).

Am 180. Tag (s. Tabelle 2) stehen in Gruppe 2 noch 12 Hunde (22,64 %) zur Beurteilung zur Verfügung. Bei 11 Hunden (91,67 %) haben sich die arthro- oder discopathischen Folgebeschwerden hochgradig gebessert, bei 3 Patienten zeigt sich auch eine auffallende Besserung des Gesamthabitus (Temperament, Bewegung, Fell) (Nr. 37, 44 und 45). 1 Patient (Nr. 36) zeigt weiterhin eine Paralyse der Hinterhand, die Schmerzempfindlichkeit hat wieder zugenommen (s.S.117).

Für Tag E (s. Tabelle 3) wird eine Beurteilung an 15 Hunden (28,30 %) vorgenommen. 13 Hunde (36,67 %) haben sich hochgradig gebessert, davon weiterhin 3 mit zusätzlicher auffallender Besserung des Allgemeinbefindens (Nr. 37, 44 und 45). Patient Nr. 36 ist weiterhin gelähmt, Patient Nr. 42 kann insgesamt nur 19 Tage beobachtet werden, davon 9 Tage nach Beginn Therapie B, da er dann auf Wunsch des Besitzers euthanasiert wird (Nr. 42, s.S.119).

Gruppe 3: NeyArthros + NeyChondrin

Am 100. Tag (s. Tabelle 1) können 13 Patienten (24,53 %) beurteilt werden. 3 Patienten befinden sich noch in Gruppe 1. 9 Hunde (69,23 %) haben sich bis zu diesem Zeitpunkt gebessert, bei 4 Hunden halten die Beschwerden unverändert an. Alle 4 Patienten werden nach diesem Zeitpunkt

nicht mehr beurteilt, da die Besitzer eine weitere Therapie ablehnen (Nr. 8, s.S.102 , Nr. 16, s.S.108 , Nr. 17, s.S.109 und Nr. 48, s.S.120.

Für die Beurteilung am 180. Tag (s. Tabelle 2) stehen 7 Patienten (13,21 %) zur Verfügung. 1 Patient ist in Gruppe 1 in ein schlechteres Stadium gekommen und wird deshalb in Gruppe 3 mit NeyChondrin weiterbehandelt (Nr. 21, s.S. 95). Hier gehört er zu den 6 Hunden (85,7 %), die sich hochgradig gebessert haben. Insgesamt haben sich alle Hunde, die bis zum 180. Tag mit Ney Arthros und NeyChondrin behandelt wurden, gebessert.

Für Tag E (s. Tabelle 3) ergeben sich in Gruppe 3 folgende Zahlen: 12 Hunde (75 %) haben sich gebessert, davon 10 (62,5 %) hochgradig. Mit +4 kann in dieser Gruppe kein Patient beurteilt werden. Mehr als die Hälfte (57 %) aller Patienten, die sich nicht gebessert haben, finden sich in dieser Gruppe. Das liegt auch daran, daß besonders gravierende und stark therapieresistente Fälle in diese Gruppe aufgenommen wurden.

3.3.2 Diagnosegruppen (Tabelle 4; Gesamtübersicht S. 94 , Spalte 3)

Von den 29 Hunden aus Gruppe 1 (Gelenkerkrankungen) haben sich bis zum 100. Tag 25 (86,21 %) gebessert. Im selben Zeitraum besserten sich in Gruppe 2 (Wirbelsäulenerkrankungen) von 23 Hunden 21 (91,3 %). Am 180. Tag stehen in Gruppe 1 die 4 Hunde, die sich nicht gebessert hatten, zur Beurteilung nicht mehr zur Verfügung, da die Besitzer eine Weiterbehandlung ablehnten.

Das gleiche gilt für einen Patienten aus Gruppe 2. 2 Hunde (Nr. 15 und 24) haben sich zu diesem Zeitpunkt vorübergehend wieder verschlechtert, d.h. die arthro- oder discopathischen Folgebeschwerden sind wieder stärker geworden, so daß sich am 180. Tag von den jeweils 20 zur Beurteilung zur Verfügung stehenden Patienten in Gruppe 1 alle und in Gruppe 2 17 (85%) gebessert haben. Im Gesamtergebnis (Tag E) haben sich in beiden Gruppen prozentual etwa gleichviel Fälle gebessert oder nicht gebessert. 2 der 3 am Tag E für Gruppe 2 angegebenen unveränderten Patienten sind nicht identisch mit den im gleichen Feld für den 180. Tag angegebenen Hunde.

Wie bereits erwähnt, haben sich 3 Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen mit einer ausschließlichen NeyArthros-Therapie gebessert. Von den Patienten mit Gelenkerkrankungen (Diagnosegruppe 1) wurde keiner ausschließlich mit NeyChondrin behandelt. Die größte Anzahl nicht gebesserter Patienten findet sich in Diagnosegruppe 1 und der Therapiegruppe 3. Es handelt sich um die Patienten Nr. 8, 16 und 48 (s.S. 102, 108 und 120). Diese Patienten wurden zwar nach 100 Tagen nicht weiter beurteilt, sind jedoch von vorneherein mit NeyArthros und NeyChondrin behandelt worden, einer von ihnen allerdings nur einmal mit je 1 Ampulle Sol. Die beiden anderen müssen aber doch, trotz Abbruch, als echte Negativfälle betrachtet werden (s. Fallbeschreibungen). Die 6 Patienten in Diagnosegruppe 2 unter Therapiegruppe 1, 100. Tag (*) reduzieren sich bis zum Endergebnis um die 3 Patienten (Nr. 15, 21 und

24) die deshalb zunächst in Therapiegruppe 1 behandelt wurden, weil anfangs nur die Hüftgelenkdysplasie als alleinige Ursache der Beschwerden angenommen wurde. Am 180. Tag befindet sich 1 Patient (Nr. 21) bereits in Gruppe 3 (*), 2 Patienten (Nr. 15 und 24) haben sich wieder verschlechtert (*) und bessern sich erst nach Behandlung mit NeyChondrin.

3.3.3 Altersgruppen (Tabelle 5; Gesamtübersicht S. 94 , Spalte 4)

Von den Hunden aus Altersgruppe 1 gehörten 15 (75 %) zur Diagnosegruppe 1 und 5 (25 %) zur Diagnosegruppe 2. Aus Altersgruppe 2 gehörten 11 Tiere (52,38 %) zur Diagnosegruppe 1 und 10 (47,62 %) zur Diagnosegruppe 2. Aus Altersgruppe 3 gehören 3 Hunde (25 %) zur Diagnosegruppe 1 und 9 Hunde (75 %) zur Diagnosegruppe 2. In Altersgruppe 1 zeigten 19 Hunde (95 %) eine Besserung der Beschwerden, in Gruppe 2 waren es 17 Hunde (81 %) und in Gruppe 3 10 Hunde (83 %).

3.3.4 Rassegruppen (Tabelle 6; Gesamtübersicht S. 94 , Spalte 5)

Von den kleinen Hunden litten alle 16 unter Enchondrosis intervertebralis, 5 mittelgroße Hunde (83,3 %) litten unter Arthropathia deformans und/oder Hüftgelenkdysplasie. 1 Patient (der Beagle) litt unter Enchondrosis intervertebralis. Von den 26 großen Hunden gehörten 19 (73,08 %) der Diagnosegruppe 1 und 7 Patienten (26,92 %) der Diagnosegruppe 2 an.

Die 5 schweren Hunde litten alle unter Arthropathia deformans der Ellbogen- und/oder Kniegelenke. Die kleinen und mittelgroßen Rassen liegen mit 91 % Besserung deutlich über dem Ergebnis für die großen und schweren Rassen, das mit 84 % Besserung unter dem Gesamtdurchschnitt liegt. Die 5 Angehörigen der schweren Rassen haben sich alle hochgradig gebessert. Alle 5 litten primär unter Arthropathia deformans der Ellbogen- und/oder Kniegelenke. 4 wurden ausschließlich mit NeyArthros behandelt, 3 gehörten der Altersgruppe 1, 2 der mittleren Altersgruppe an. 3 erhielten nur einmal 1 Injektion Sol nach der Dilutionsvorbehandlung, von diesen wiederum 2 nur je 1 Ampulle NeyArthros-Sol.

Gesondert betrachtet werden sollte hier die große Gruppe der Schäferhunde. Hier haben sich von 15 Hunden nur 12 (80 %) gebessert, 3 Hunde haben sich nicht gebessert. Die anderen Hunde, die ihre Beschwerden behalten haben, sind 1 Collie (Nr. 48, s.S. 120), 1 Boxer (Nr. 8, s.S. 102), 1 Rauhaardackel, der allerdings schon gelähmt war als er zur Behandlung kam (Nr. 36, s.S. 118) und ein Langhaardachshund, der nach 9 Tagen wegen vermehrten Auftretens epileptiformer Anfälle (zu denen er vor der Behandlung auch schon neigte) auf Wunsch des Besitzers eingeschläfert wurde (Nr. 42, s.S. 119).

3.3.5 Therapiearten (Tabelle 7; Gesamtübersicht S. 94 , Spalte 6)

Verbesserungen der Beschwerden zeigten sich oft schon nach 3 bis 4 Dilutions-Injektionen. Bei

1 Patienten (Therapieartgruppe 2) (Pat. Nr. 7) wurde deshalb ganz auf das Sol-Präparat verzichtet. 9 weitere Patienten zeigten eine ähnlich schnelle Besserung und erhielt nur 1 Ampulle des entsprechenden Sol-Präparates (8 in der Therapiegruppe 1, 1 in Therapiegruppe 2). Auch 7 weitere Patienten erhielten nur einmal je 1 Injektion Sol nach Abschluß der Dilutions-Serie, 6 von ihnen als Kombination NeyArthros/NeyChondrin. Diese Gruppe (Therapieartgruppe 3) ist die Gruppe mit der höchsten Besserungsrate (94 %).

Auch die Gruppe mit Therapieart 5 zeigt mit 90 % Besserungsrate ein gutes Ergebnis. 2 dieser Patienten hatten sich nach 1 Sol-Injektion zunächst gebessert, dann aber ein Rezidiv erlitten, so daß die Therapie dann mit einer Dilutions-Vorkur noch einmal durchgeführt wurde. 1 Patient (Nr. 8, s.S.102) hat sich weder nach der einzelnen Sol-Injektion, noch nach der Dilutions-Serie + Sol-Injektionen gebessert. (Nachtrag zum Oktober 1986: Auch dieser Hund hat sich inzwischen nach einer Wiederholung der Therapie so gebessert, daß er fast Lahmheitsfrei läuft). 7 Patienten erhielten die Sol-Injektion, meist wegen hochgradiger Beschwerden, 1 oder 2 Tage vor Beginn der Dilutions-Serie. Ob dies therapeutisch und immunologisch sinnvoll war, ist nicht mehr festzustellen. Alle 7 Patienten haben sich jedoch gebessert.

3.3.6 Geschlecht(Tabelle 8; Gesamtübersicht S. 94, Spalte 7)

Von den männlichen Hunden litten 20 (54,05 %)

unter Hüftgelenkdysplasie und/oder Arthropathia deformans, 17 Rüden (45,95 %) hatten Wirbelsäulenerkrankungen.

9 weibliche Hunde (56,25 %) litten unter Gelenk- und 7 Hündinnen (43,75 %) unter Wirbelsäulenerkrankungen. Der Anteil der Hunde, die sich gebessert haben, liegt bei den weiblichen mit 94 % weitaus höher als bei den Rüden mit 84 %. Der einzige weibliche Patient der sich nicht gebessert hat, eine Schäferhündin, gehört zur Therapiegruppe 1, in die mittlere Altersgruppe, und erhielt nach einer Dilutions-Serie 2 x 1 Injektion NeyArthros-Sol. Nachdem die Hündin sich innerhalb von 3 Monaten nicht gebessert hatte, lehnte der Besitzer eine weitere Therapie ab (Nr. 23, s.S.112).

3.3.7 Vergleichende Bewertung Therapie A - Therapie B (Tabelle 9)

Zum Vergleich stehen für jede Therapieform je 25 (identische) Hunde zur Verfügung, da hier ausnahmsweise die Bewertung auch dann vorgenommen wurde, wenn der 100. Tag nach dem 31.03.1986 (Stichtag: Ende der Untersuchungen) -lag. Auf diese Weise stehen mehr Patienten zum Vergleich zur Verfügung. Von den 25 Patienten haben sich bis zum 100. Tag unter Therapie A 17 (68 %), unter Therapie B 21 (84 %) gebessert. Es handelt sich in beiden Gruppen, wie gesagt, um dieselben Hunde. Es wurden nur Hunde berücksichtigt, die bei beiden Therapiearten am 100. Tag zur Verfü-

gung standen. Der Unterschied zwischen beiden Therapieformen ist auf dem Signifikanzniveau 0,05 mit $p \leq 0,005$ signifikant. Die Gesamtbesserungsquote ist bei Therapie A die gleiche, da am 100. Tag in Therapie A nicht mehr als die oben genannten 25 Hunde zur Verfügung standen. Insgesamt haben sich unter Therapie B zum 100. Tag 46 von 52 Hunden (88 %) gebessert.*Wilcoxon-Rang-Test.

Vergleichende Bewertung 180. Tag Therapie A - Therapie B (Tabelle 10)

Zum 180. Tag stehen für die vergleichende Bewertung in beiden Therapiegruppen je 15 Patienten zur Verfügung. Auch diese sind identisch. Insgesamt standen am 180. Tag bei Therapie A 20 und bei Therapie B 40 Patienten für eine Bewertung zur Verfügung. Die 15 Patienten, die in Gruppe A und B am 180. Tag bewertet werden konnten, haben sich unter Therapie A zu 60 % (9), unter Therapie B zu 93 % (14) gebessert. Diese Ergebnisse entsprechen in etwa den Gesamtergebnissen für beide Gruppen an diesem Tag (55 % und 92,5 %). Unter Therapie A haben sich 2 Hunde bis zum 180. Tag verschlechtert. Der Hund, (Nr. 11, s.S. 104) der am 180. Tag unter Therapie A die Bewertungsnote -1 erhielt, erhielt am entsprechenden Tag während Therapie B die Note +4. Der Hund (Nr. 13, s.S. 95), der unter Therapie A am 180. Tag die Bewertungsnote -2 erhielt, konnte am entsprechenden Tag bei Therapie B mit der Note +3 bewertet werden.

Vergleichende Bewertung Tag E Therapie A - Therapie B (Tabelle 11)

Zur vergleichenden Bewertung an Tag E gilt das

auf den Seiten 45 und 46 gesagte. An dem Tag, an dem mit Therapie B (zytoplasmatische Therapie) begonnen wurde, hatten sich von den 45 vorbehandelten Hunden 31 im Vergleich zu den Ausgangsbeschwerden nicht gebessert, 9 Hunde waren sogar in ein schlechteres Stadium gekommen. 5 Hunde, das sind 11 % der vorbehandelten Patienten, gingen mit der Bewertungsnote +2 in Therapie B.

Weitere Ergebnisse (Gesamtübersicht S. 94 und 95)

Die 45 mit Therapie A vorbehandelten Tiere hatten bis zum Beginn der Therapie B im Durchschnitt erhalten:

99,73 mg Prednisolon (Spalte 11A)

5,62 Magnetfeldbestrahlungen (Spalte 12A)

4,61 B₁₂-Injektionen (Spalte 13A)

3,51 Ampullen (2 ml) Impletol (Spalte 14A)

40 Patienten (88,89 %) hatten zusätzlich Phenylbutazon oral eingenommen (Spalte 15A).

Bei 5 Hunden waren die Musculi pectinei teilweise entfernt worden und zwar durchschnittlich 130,6 Tage vor Beginn der zytoplasmatischen Therapie (Spalte 17).

Bei einem Hund (Nr. 8, s.S. 102) wurde 486 Tage vor Beginn der Therapie B eine Fascientransplantation an einem Kniegelenk durchgeführt (Spalte 17).

Die 53 mit zytoplasmatischer Therapie (Therapie B) behandelten Tiere erhielten im Durchschnitt:

54,91 mg eines oder verschiedener Sol-Präparate (Spalte 11B)

9,36 ml eines Dilutionspräparates

5,57 mg Prednisolon (Spalte 11B)

3,96 Magnetfeldbestrahlungen (Spalte 19B)

1,38 Injektionen Vitamin B₁₂ (Spalte 13B)

2,34 ml Impletol (Spalte 14B)

2 Patienten wurden auch während der zytoplasmatischen Behandlung Phenylbutazon zur oralen Einnahme rezeptiert (Spalte 15A/16B).

42 Patienten (79,25 %) erhielten zusätzlich von ihren Besitzern Lingual-Präparate verabreicht (Spalte 16B).

Bei den 45 vorbehandelten Patienten (Therapie A) betrug der durchschnittliche Beobachtungszeitraum bis zum Beginn von Therapie B 218,16 Tage (ca. 7,27 Monate) (Spalte 21A). Dieselben 45 Patienten konnten dann während Therapie B (B_A) durchschnittlich 229,22 Tage (ca. 7,74 Monate) beobachtet werden. Insgesamt wurde jeder Patient nach Beginn Therapie B (B_{Gesamt}) durchschnittlich 232,81 Tage (ungefähr 7,76 Monate) beobachtet (Spalte 21AB).

Rezidive (Tabelle 12)

Als Rezidiv wurden nur solche Beschwerden angesehen, die eine Behandlung notwendig machten. In den ersten 100 Tagen erlitten während: (Spalte 18 AB)

Therapie A_B: 22 Patienten (48,49 %) durchschnittlich 0,59 Rezidive (insg. 13 Rez.)*

Therapie B_A: 22 Patienten (43,39 %) durchschnittlich 0,09 Rezidive (insg. 2 Rez.)*

Therapie A_{Gesamt}: 23 Patienten (51 %) durchschnittlich 0,57 Rezidive (insg. 13 Rez.)

Therapie B_{Gesamt}: 48 Patienten (90,57 %) durchschnittlich 0,10 Rezidive (insg. 5 Rez.)

* Differenz Therapie A_B zu B_A: Signifikanzniveau 0,05; Vorzeichentest: $p \leq 0,039$, signifikant; Wilcoxon-Rang-Test: $p \leq 0,028$, signifikant.

Nach 180 Tagen hatten während: (Spalte 19AB)

Therapie A_B: 13 Patienten (28,89 %) durchschnittlich 0,92 Rezidive (insg. 12 Rez.)*

Therapie B_A: 13 Patienten (24,53 %) durchschnittlich 0,31 Rezidive (insg. 4 Rez.)*

Therapie A_{Gesamt}: 18 Patienten (40,0 %) durchschnittlich 0,89 Rezidive (insg. 16 Rez.)

Therapie B_{Gesamt}: 40 Patienten (75,47 %) durchschnittlich 0,25 Rezidive (insg. 10 Rez.) erlitten.

* A_B zu B_A: Signifikanzniveau 0,05: Vorzeichen-test $p \leq 0,344$
Wilcoxon-Rang-Test: $p \leq 0,114$,
nicht signifikant

Insgesamt traten während: (Spalte 20AB)

Therapie A_B: Bei 33 Patienten (73,33 %) durchschnittlich 2,03 Rezidive (insg. 67 Rez.)*

Therapie B_A: Bei 33 Patienten (62,26 %) durchschnittlich 0,30 Rezidive (insg. 10 Rez.)*

Therapie A_{Gesamt}: Bei 35 Patienten (77,78 %) durchschnittlich 2,26 Rezidive (insg. 79 Rez.)

Therapie B_{Gesamt}: Bei 48 Patienten (90,57 %) durchschnittlich 0,33 Rezidive (insg. 16 Rez.) auf.

* Statistisch nicht vergleichbar, da unterschiedliche Zeiträume.

3.3.7.1 Statistische Auswertung

für die vergleichende Bewertung Therapie A - Therapie B an verschiedenen Tagen.

(Signifikanzniveau $p \leq 0,05$)

Tag	Wilcoxon-Rang-Test	Vorzeichen-Test
	2 seitig	2 seitig, binomial
30 p $\leq 0,0001$	signifikant	0,001 signifikant
60 p $\leq 0,002$	signifikant	0,001 signifikant
90 p $\leq 0,002$	signifikant	0,001 signifikant
100 p $\leq 0,041$	signifikant	0,035 signifikant
120 p $\leq 0,005$	signifikant	0,002 signifikant
180 p $\leq 0,005$	signifikant	0,006 signifikant

für die Rezidive

Tag	Wilcoxon-Rang-Test	Vorzeichen-Test
	2 seitig	2 seitig, binomial
100 p $\leq 0,028$	signifikant	0,039 signifikant
180 p $\leq 0,114$	nicht signifikant	0,344 nicht signifikant

Ergebnis: Der Unterschied zwischen Therapie A und Therapie B in der Besserung der Hunde an den Bewertungsstichtagen ist signifikant oder: an den Bewertungsstichtagen haben sich die Hunde während Therapie B im Vergleich zu Therapie A signifikant gebessert.

Der Unterschied in der Rezidivhäufigkeit ist zum 100. Tag signifikant, zum 180. Tag in der Verminderung der Rezidive zugunsten Therapie B zwar noch auffallend (3:1), statistisch wegen der geringen Anzahl an Differenzen aber nicht mehr signifikant.

Tabelle 1

Bewertung 100. Tag Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

Therapie Bewertung	B _{Gesamt} 100. Tag		NeyArthros ^R 100. Tag		NeyChondrin ^R 100. Tag		NA + NC 100	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
+ 4	4	0,08	2	0,08	2	0,14	/	/
+ 3	34	0,65	17	0,68	10	0,71	7	0,54
+ 2	8	0,15	5	0,20	1	0,07	2	0,15
Gebessert	46	0,88	24	0,96	13	0,93	9	0,69
+ 1	1	0,02	/	/	1	0,07	/	/
0	5	0,10	1	0,04	/	/	4	0,31
Unverändert	6	0,12	1	(0,04)	1	(0,07)	4	0,31
Summen:	52	1,00	25*	1,00	14	1,00	13*	1,00

NA = NeyArthros
NC = NeyChondrin

* 3 Patienten noch in Gruppe 1

Zu: Tabelle 1; Bewertung 100. Tag Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen




Tabelle 2

Bewertung 180. Tag Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

Therapie Bewertung	B _{Gesamt} 180. Tag		NeyArthros ^R 180. Tag		NeyChondrin ^R 180. Tag		NA + NC 180. Tag	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
+ 4	5	0,125	2	0,09	3	0,25	/	/
+ 3	29	0,725	15	0,71	8	0,67	6	0,86
+ 2	3	0,075	2	0,09	/	/	1	0,14
Gebessert	37	0,925	19	0,90	11	0,92	7	1,00
+ 1	1	0,025	1	0,05	/	/	/	/
0	2	0,05	1	0,05	1	0,08	/	/
Unverändert	3	(0,08)	2*	0,10	1	(0,08)	0	/
Summen:	40	1,00	21*	1,00	12	1,00	7*	1,00

NA = NeyArthros
NC = NeyChondrin

* 2 Patienten noch in Gruppe 1

Zu: Tabelle 2; Bewertung 180. Tag Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen





Tabelle 3

Bewertung Tag E Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

Therapie Bewertung	B _{Gesamt}		E		NeyArthros ^R		NeyChondrin ^R		NA + NC	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
+ 4	5	0,09	2	0,09	3	0,2	/	/	/	/
+ 3	35	0,66	15	0,68	10	0,66	10	0,66	10	0,625
+ 2	6	0,11	4	0,18	/	/	2	/	2	0,125
Gebessert	46	0,87	21	0,95	13	0,87	12	0,75		
+ 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0	7	0,13	1	0,05	2	0,13	4	0,25		
Unverändert	7	0,13	1	(0,05)						
Summen:	53	1,00	22	1,00	15	1,00	16	1,00		

E = Tag E (Stichtag 31.03.86 bzw. Todestag bzw. 100. Tag bei den Patienten, deren Besitzer eine Weiterbehandlung nicht wünschten). NA = NeyArthros, NC = NeyChondrin

Zu: Tabelle 3; Bewertung Tag E Therapie B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

 = gebessert
 = unverändert




Tabelle 4

Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie an Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung))

Gesamt und nach Diagnose- und Therapiegruppen

Therapiegruppe: Tag: Diagnosegr.	Gesamt						Gr. 1 NeyArthros ^R						Gr. 2 NeyChondrin ^R						Gr. 3 NA + NC					
	100		180		E		100		180		E		100		180		E		100		(180)		E	
	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.
Gebessert	46	0,88	37	0,95	46	0,87	24	0,96	19	0,90	21	0,95	13	0,93	11	0,92	13	0,87	9	0,69	7	1,00	12	0,75
Arthropathia de- formans und Hüftgelenkdis- plasie	25	0,48	20	0,5	25	0,47	18	0,72	16	0,76	18	0,82	/	/	/	/	/	/	7	0,54	4	0,57	7	0,44
Spondylo- o. Spondylarthrop. deformans und Enchondrosis	21	0,40	17	0,45	21	0,40	6*	0,24	3	0,14	3	0,14	13	0,93	11	0,92	13	0,87	2*	0,15	3*	0,43	5	0,31
Intervertebralis		0,91		0,85		0,875		(/)		0,6	(/)	(/)	0,93	(0,93)		0,92	(0,87)							(0,87)
Unverändert	6	0,12	3	0,075	7	0,13	1	0,04	2*	0,10	1	0,05	1	0,07	1	0,08	2	0,13	4	0,31	0	0	4	0,25
Arthropathia de- formans und Hüftgelenkdis- plasie	4	0,08	/	/	4	0,07	1	0,04	/	/	1	0,05	/	/	/	/	/	/	3	0,23	/	/	3	0,1*
Spondylo- o. Spondylarthrop. deformans und Enchondrosis	2	0,04	3	0,075	3	0,06	/	/	2*	0,10	/	/	1	0,07	1	0,08	2	0,13	1	0,06	/	/	1	0,04
Intervertebralis				0,15		0,125				0,4	(0,4)			0,07		0,08	(0,13)							0,17
Summen:	52	1,00	40	1,00	53	1,00	25*	1,00	21*	1,00	22*	1,00	14	1,00	12	1,00	15	1,00	13*	1,00	7*	1,00	16	1,00

* 3 Patienten noch in Gruppe 1

• 2 Patienten noch in Gruppe 1

100 = 100. Tag

180 = 180. Tag

E = Tag E

NA = NeyArthros

NC = NeyChondrin

 = gebessert


 = unverändert

Zu Tabelle 4; Bewertung Therapie B nach Diagnosegruppen

absolut:



relativ:



Tag 100 Gruppe 1 2 Tag 180 1 2 1 2

Tabelle 5

Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie an Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung))

Nach Alters- und Therapiegruppen

Therapiegruppe: Tag:	Gesamt			Gr. 1 NeyArthros ^R			Gr. 2 NeyChondrin ^R			Gr. 3 NA + NC														
	100	180	E	100	180	E	100	180	E	100	(180)	E												
	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.	abs. rel. abs. rel. abs. rel.												
Gebessert	46	0,88	37	0,93	46	0,87	24	0,96	19	0,90	21	0,95	13	0,93	11	0,92	13	0,87	9	0,69	7	1,00	12	0,75
1 - 5 Jahre	19	0,36	13	0,32	19	0,36	8	0,32	7	0,33	8	0,36	4	0,29	2	0,17	4	0,27	7	0,54	4	0,57	7	0,44
6 - 9 Jahre	17	0,33	15	0,37	17	0,34	12	0,48	9	0,43	9	0,41	5	0,36	5	0,42	5	0,33	0*	/	1*	0,14	3	0,19
10 - 13 Jahre	10	0,19	9	0,22	10	0,19	4	0,16	3	0,14	4	0,18	4	0,29	4	0,33	4	0,27	2	0,15	2	0,29	2	0,12
Unverändert	6	0,12	3	0,07	7	0,13	1	0,04	2	0,10	1	0,05	1	0,07	1	0,08	2	0,13	4	0,31	0	0	4	0,25
1 - 5 Jahre	1	0,02	1	0,02	1	0,02	/	/	/	/	/	/	1	0,07	1	0,08	1	0,06	/	/	/	/	/	/
6 - 9 Jahre	4	0,08	2	0,05	4	0,07	1	0,04	2	0,10	1	0,05	/	/	/	/	/	/	3	0,23	/	/	3	0,19
10 - 13 Jahre	1	0,02	/	/	2	0,04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	0,06	1	0,08	/	/	1	0,06
Summen:	52	1,00	40	1,00	53	1,00	25*	1,00	21*	1,00	22	1,00	14	1,00	12	1,00	15	1,00	13*	1,00	7*	1,00	16	1,00

* 3 Patienten noch in Gruppe 1

NA = NeyArthros

NC = NeyChondrin

100 = 100. Tag


180 = 180. Tag

E = Tag E


Zu Tabelle 5: Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie an Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung)) nach Alters- und Therapiegruppen

 = gebessert
 = unverändert

absolut:



relativ:



Tag 100 Tag 180 Tag E
 Alter 1 - 5 Jahre 6 - 9 Jahre 10 - 13 Jahre 10 - 13 Jahre 10 - 13 Jahre

Tabelle 6

Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie am Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung))

Nach Rasse- und Therapiegruppen

Therapiegruppe:	Gesamt			Gr. 1 NeyArthros ^R			Gr. 2 NeyChondrin ^R			Gr. 3 NA + NC		
	100	180	E	100	180	E	100	180	E	100	(180)	E
	abs. rel. abs.	rel. abs.	rel. abs.	abs. rel. abs.	rel. abs.	rel. abs.	abs. rel. abs.	rel. abs.	rel. abs.	abs. rel. abs.	rel. abs.	rel. abs.
Tag:												
Gebessert	46 0,88 37	0,92 46	0,87 (0,91)	24 0,96 19	0,90 21	0,95 (0,93)	13 0,93 11	0,92 13	0,87 9	0,69 7	1,00 12	0,75
Kleine und mittelgroße Rassen	20 0,38 17	0,42 20	0,38 (0,91)	2 0,08 2	0,10 2	0,09 (0,93)	13 0,93 11	0,92 13	0,87 5	0,38 4	0,57 5	0,31
Große und schwere Rassen	26 0,50 20	0,50 26	0,51 (0,84)	22 0,80 17	0,80 19	0,86 (0,95)	/ /	/ /	/ /	0,31 3	0,43 7	0,44
Unverändert	6 0,12 3	0,08 7	0,13 (0,84)	1 0,04 2	0,10 2	0,05 (0,95)	1 0,07 1	0,08 2	0,13 4	0,31 0	0 4	0,25
Kleine und mittelgroße Rassen	1 0,02 1	0,03 2	0,04 (0,05)	/ /	/ /	/ /	1 0,07 1	0,08 2	0,13 1	/ /	/ /	/
Große und schwere Rassen	5 0,10 2	0,05 5	0,09 (0,16)	1 0,04 2	0,10 2	0,05 (0,11)	/ /	/ /	/ /	0,31 1	/ 4	0,25
Summen:	52 1,00 40	1,00 53	1,00 (0,91)	25* 1,00 21*	1,00 22	1,00 (0,95)	14 1,00 12	1,00 15	1,00 13*	1,00 7*	1,00 16	1,00

* 3 Patienten noch in Gruppe 1

NA = NeyArthros

100 = 100. Tag

NC = NeyChondrin

180 = 180. Tag

E = Tag E

2 Patienten noch in Gruppe 1

Zu Tabelle 6: Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie am Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung) nach Rasse- und Therapiegruppen

 = gebessert
 = unverändert

absolut:




Tabelle 7

Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie am Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung))

Nach Therapieart und Therapiegruppen

Therapiegruppe: Tag:	Gesamt						Gr. 1 NeyArthros ^R						Gr. 2 NeyChondrin ^R						Gr. 3 NA + NC					
	100		180		E		100		180		E		100		180		E		100		(180)		E	
	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.	abs.	rel.
Gebessert	46	0,88	37	0,92	46	0,87	24	0,96	19	0,90	21	0,95	13	0,93	11	0,92	13	0,87	9	0,69	7	1,00	12	0,75
1-2 x Sol	10	0,19 (0,83)	8	0,20	10	0,19 (0,83)	2	0,08	1	0,05	2	0,09	6	0,43	5	0,42	6	0,4	2	0,15 (0,50)	2	0,29	2	0,125 (0,5)
5xDil	1	0,02 (/)	1	0,025	0	0,02	1	0,04	1	0,05	1	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5xDil+1xSol	16	0,31 (0,94)	12	0,30	16	0,30 (0,94)	10	0,40	8	0,38	9	0,41	1	0,07	/	/	1	0,07	5	0,38 (0,83)	4	0,57	6	0,375 (0,86)
5xDil+2xSol	10	0,19 (0,83)	7	0,175 (0,7)	10	0,19 (0,77)	7	0,28 (0,875)	5	0,24 (0,71)	5	0,23 (0,83)	2	0,14 (0,67)	2	0,17 (0,67)	2	0,13 (0,50)	1	0,08	/	/	3	0,19
1-2xSol+5xDil+ 1-2xSol	9	0,17 (0,9)	9	0,229	9	0,17 (0,90)	4	0,16	4	0,19	4	0,18	4	0,29	4	0,33	4	0,27	1	0,08 (0,5)	1	0,14	1	0,06
Unverändert	6	0,12	3	0,08	7	0,13	1	0,04	2	0,10	1	0,05	1	0,07	1	0,08	2	0,13	4	0,31	0	0,22	4	0,25
1-2 x Sol	2	0,04 (0,17)	/	/	2	0,07 (0,17)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	0,15 (0,50)	/	/	2	0,125 (0,5)
5xDil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5xDil+1xSol	1	0,02 (0,06)	/	/	1	0,02 (0,06)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	0,08	/	/	1	0,06 (0,14)
5xDil+2xSol	2	0,04 (0,17)	3	0,08 (0,3)	3	0,06 (0,23)	1	0,04 (0,12)	2	0,10 (0,29)	1	0,05 (0,17)	1	0,07 (0,33)	1	0,08 (0,33)	2	0,13 (0,50)	/	/	/	/	/	/
1-2xSol+5xDil+ 1-2xSol	1	0,02 (0,1)	/	/	1	0,02 (0,1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	0,08 (0,5)	/	/	1	0,06 (0,5)
Summen:	52	1,00	40	1,00	53	1,00	25	1,00	21*	1,00	22	1,88	14	1,00	12	1,00	15	1,00	13*	1,00	7*	1,00	16	1,00

NA = NeyArthros

NC = NeyChondrin

100 = 100. Tag

180 = 180. Tag

E = Tag E

* 3 Patienten noch in Gruppe 1

• 2 Patienten noch in Gruppe 1

Zu Tabelle 7: Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie an Tag E
(31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung))
nach Therapieart und Therapiegruppen


▨ = gebessert
▩ = unverändert

absolut:



75 -

relativ:



Tag E

Tag 180

Tag 100

Zu Tabelle 8: Bewertung Therapie B am 100. u. 180. Tag p.p.i. sowie an Tag E (31.03.86 bzw. Todes- bzw. 100. Tag (keine Weiterbehandlung) nach Geschlechts- und Therapiegruppen




Tabelle 9

Bewertung 100. Tag Therapie A_(B), B_A und B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

Therapie Bewertung	A _(B) 100		B _A 100		B _{Gesamt} 100	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
+ 4	0	/	1	0,04	4	0,08
+ 3	9	0,36	17	0,68	34	0,65
+ 2	8	0,32	3	0,12	8	0,15
Gebessert	17	0,68	21	0,84	46	0,88
+ 1	3	0,12	1	0,04	1	0,02
0	5	0,20	3	0,12	5	0,10
Unverändert	8	0,32	4	0,16	6	0,12
Summen:	25*	1,00	25*	1,00	52	1,00

* auch über den 31.3.86 hinaus, dadurch 25 Patienten in A u. B_A

A_(B) 100 = Anzahl der Patienten, die mit Therapie "A" behandelt wurden und sowohl nach Therapie A als auch nach Therapie B nach 100 Tagen zur Bewertung zur Verfügung standen. (In dieser Tabelle identisch mit A).



B_A 100 = Anzahl aller

Patienten die mit Therapie B behandelt wurden und sowohl nach Therapie A als auch nach Therapie B nach 100 Tagen zur Bewertung zur Verfügung standen. (* um den Vergleich zwischen A_(B) und B_A

zu objektivieren wurde ausnahmsweise der 31.03.86 als Stichtag nicht berücksichtigt, so daß für beide Therapieformen jeweils 25 (identische) Patienten zur Verfügung stehen.

100 = 100. Tag

Zu Tabelle 9; Vergleichende Bewertung 100 Tag Therapie $A_{(B)}$ B_A und B_{Gesamt}



relativ:




Tabelle 10

Bewertung 180. Tag Therapie A_B (A), B_A und B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

Therapie Bewertung	A_B (A) 180. Tag		B_A 180. Tag		B_{Gesamt} 180. Tag	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
+ 4			2	0,13	5	0,125
+ 3	3 (5)	0,2 (0,25)	11	0,73	29	0,725
+ 2	6 (6)	0,4 (0,30)	1	0,07	3	0,075
Gebessert	9 (11)	0,6 (0,55)	14	0,93	37	0,925
+ 1	3 (5)	0,2 (0,25)	1	0,07	1	0,025
0	1 (2)	0,07(0,10)	/	/	2	0,05
Unverändert	4 (7)	0,27(0,35)	1	(0,07)	3	(0,08)
- 1	1 (1)	0,07(0,05)				
- 2	1 (1)	0,07(0,05)				
Verschlechtert	2 (2)	0,13(0,10)				
Summen:	15 (20)	1,00	15	1,00	40	1,00




Tabelle 11


Bewertung Tag E Therapie A_(B), Bund B_{Gesamt} sowie Therapiegruppen

Therapie		A		E		B _A		E		B _{Gesamt}		E	
Bewertung		absolut		relativ		absolut		relativ		absolut		relativ	
+ 4 + 3 + 2		0		/		5		0,11		5		0,09	
		0		/		30		0,67		35		0,66	
		5		0,11		4		0,09		5		0,11	
Gebessert		5		0,11		39		0,87		46		0,87	
+ 1 0		7		0,16		/		/		/		/	
		24		0,53		6		0,13		7		0,13	
Unverändert		31		0,69		6		0,13		7		0,13	
- 1 - 2 - 3 - 4		5		0,11									
		2		0,04									
		1		0,02									
		1		0,02									
Verschlechtert		9		0,20									
Summen:		45		1,00		45		1,00		53		1,00	

E = Tag E

Zu Tabelle 11: Vergleichende Bewertung Tag E Therapie $A_{(B)}$ Bund B_{Gesamt}

absolut:



relativ:





Tabelle 12

Rezidive bis zum 100. u. 180. Tag und bis Tag E für Therapie A_B, B_A, A_{Gesamt} und B_{Gesamt}

	Therapie A _B			Therapie B _A			Therapie A _{Gesamt}			Therapie B _{Gesamt}		
	Pat.	Rez.	Rez./Pat	Pat.	Rez.	Rez./Pat	Pat.	Rez.	Rez./Pat	Pat.	Rez.	Rez./Pat
100. Tag	22	13	0,59	22	2	0,09	23	13	0,57	48	5	0,10
180. Tag	13	12	0,92	13	4	0,31	18	16	0,89	40	10	0,25
Tag E	33	67	2,03	33	10	0,30	35	79	2,26	48	16	0,33

Pat. = Patienten

Rez. = Rezidive



3.3.8 Laboruntersuchungen (Tabelle 13a - d)

Urinuntersuchungen mit dem Combur-9-Teststreifen (Boehringer, Mannheim) wurden während Therapie A insgesamt 19 x, während Therapie B insgesamt 49 x durchgeführt. Nimmt man für die Testfelder für Leukozyten, Eiweiß, Glucose, Keton, Urobilinogen, Bilirubin und Blut jeweils 1 - 3 mögliche Negativpunkte und für die Testfelder für Nitrit und den ph-Wert je 1 Negativpunkt an, so ergeben sich für Therapie A 437 und für Therapie B 1127 mögliche Negativpunkte. Von diesen entfielen auf Therapie A 37 und auf Therapie B 82 Negativpunkte, so daß sich die auffälligen Veränderungen pro Patient pro Untersuchung mit 0,085 (Therapie A) und 0,073 (Therapie B) nur geringfügig unterscheiden.

Ebenso verhält es sich mit der Keimbestimmung im Urin (Uricult, Boehringer, Mannheim).

Von den 18 während Therapie A durchgeführten bakteriologischen Untersuchungen des Urins waren 5 positiv, bei Therapie B waren 11 positiv. Auch hier ist der Unterschied zwischen Therapie A und B in der Anzahl der positiven Uricult-Ergebnisse pro Untersuchung pro Patient mit 0,28 (Therapie A) und 0,26 (Therapie B) nicht besonders groß.

Auch die Ergebnisse der Blutuntersuchungen lassen für einen Vergleich der Therapiearten keine Rückschlüsse zu. In Therapie A waren von 129 Parametern 26, in Therapie B von 428 Parametern 73 auffällig.

Die auffälligen Veränderungen pro Patient pro Untersuchung sind mit 0,20 (Therapie A) und 0,17 (Therapie B) in beiden Gruppen annähernd gleich.

Tabelle 11a

LABORUNTERSUCHUNGEN

• = Normal

	Normal- werte	2		3		4				11				15			
		A (H)	B	A (B-154)	B	B	B	B	B	A (B-214)	A (H)	B	B	B	B	B	B
Temperatur	38,2° - 38,9°C	750	12	151	8	146	145	146	1	198	17	174	213	1	18	109	186
Therapie:		430T5x 435a2x							685a1 430T5x 685a1	430T5x 435a2x	43	43	Sal	430T5x 435a2x	217-435a1	435a1 435a1 685a1	
Urin:									+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+
Leukozyten	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nitrit	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
pH	5	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eiweiß	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glucose	normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keton	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Urobilinogen	normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bilirubin	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blut (Erythrozyten)	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(Hämoglobin)									+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	+
Uricult	negativ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keime									•	•	•	•	•	•	•	•	•
angew. Therapeutikum									E. coli	E. coli	E. coli	E. coli	E. coli	E. coli	E. coli	E. coli	E. coli
Blut:									7300	10.500	11.100	11.100	16.300	7600	7600	6900	7500
Leukozyten	6-12.000	16.200	11.200	11.100	7000				2	24	30	46	70	101	30	55	63
Erythrozyten	5-8 Mio.	55	8	7	50	3			21	29	58	42	50	54	50	50	46
Senkung (24 Std.)	19-33 mm	25	38	25	38	221	221	221	0,7	42	21	33	25	54	50	50	46
Harnstoff	20-50 mg%																
Creatinin	-1,6 mg%																
Alkalische- phosphatase	-190 U/L	•	•	•	96 (187)				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glutamat-Pyruvat- Transaminase	20-40 U/L	•	•	•	13				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glutamat-Oxalacetat Transaminase	- 40 U/L	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lactat- Dehydrogenase	- 100 U/L	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glutamat- Dehydrogenase	- 6 U/L	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamteiweiß	5-7 g%	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lipase	-300 U/L	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glucose									•	•	•	•	•	•	•	•	•

B 215 = Wertrest

Tabelle 13 c

LABORUNTERSUCHUNGEN

	Normal- werte	29			30			34			35			36			46		
		A(Hu) B	B	B	A(Hu) B	A(Hu) B	B	Pred. 10	(AB) (AB) B	B	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	Pred. 10 (88u)	B	A(Hu) B	B	B	E.coli 8	B	B
Temperatur	38,2° - 38,9°	601 17	183	204	365	39,2	38,7	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	110 15	110 15	110 15	46	46	46
Therapie:		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Urin:		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Leukozyten	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Nitrit	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
pH	5	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Eiweiß	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Glucose	normal	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Keton	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Urobilinogen	normal	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Bilirubin	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Blut (Erythrozyten)	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
(Hämoglobin)		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Uricult	negativ	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Keime		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Therapeutikum		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Blut:		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Leukozyten	6-12000	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Erythrozyten	5-8 Mio.	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Senkung (24 Std.)	19-35 mm	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Harnstoff	20-50 mg%	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Creatinin	- 1,6 mg%	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Alkalische- Phosphatase	AP	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Glutamat-Pyruvat- Transaminase	GPT	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Glutamat-Oxalacetat- Transaminase	GOT	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Lactat-		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Dehydrogenase	LDH	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Glutamat-		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Dehydrogenase	GLDH	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Gesamteiweiß	GE	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Lipase		435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u
Glucose	55-110 mg%	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	AI: Pred. 20 -17 -10 10 33 94	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u	435u

B365: verendet
n. Insulin-Injekt.

Tabelle 13 d

LABORUNTERSUCHUNGEN

	Normal- werte	37				39				42		43		44	
		A (M)	B	B	B	A (B-2)	B	B	B	A (M)	B	A (M)	B	A (M)	B
Temperatur	38,2° - 38,9°	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Therapie:		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Urin:		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Leukozyten	negativ	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Nitrit	negativ	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
pH	5	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
eiweiß	negativ	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Glucose	normal	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Keton	negativ	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Urobilinogen	Normal	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Bilirubin	negativ	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
blut (erythrozyten)		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
(Hämoglobin)		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Uricult	negativ	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Keime		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Therapeutikum		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Blut:		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Leukozyten	6-12.000	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Erythrozyten	5-8 Mio.	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Senkung (24 Std.)	10-35 mm	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Harnstoff	20-50 mg%	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Creatinin	1-6 mg%	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Alkalische- Phosphatase	190 U/L	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Glutamat-Pyruvat- Transaminase	20-40 U/L	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Glutamat-Oxalacetat- Transaminase	40 U/L	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Lactat-		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Dehydrogenase	100 U/L	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Glutamat-		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Dehydrogenase	6 U/L	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Gesamteiweiß	5-7 g%	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Lipase	300 U/L	37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2
Glucose		37,7	38,7	38,5	38,2	39,4	38,5	38,2	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2	38,5	38,2

Tabelle 14

LABORUNTERSUCHUNGEN

Gesamtzahl der möglichen Negativpunkte	Normal- werte	1= Anzahl Untersuchungen 2= Anzahl auffällige Veränderungen 3= Anzahl auffällige Veränderungen pro Patient pro Unter- suchung bzw. Negativpunkte pro Patient pro Untersuchung									A= während + nach Therapie A/ vor Therapie B B ₁ =vor Therapie B B _E =während Therapie B		
		1 A	2 A	1 B ₁	2 B ₁	1 B _E	2 B _E	3 A	3 B _E				
Urin:*		437*	37	46*	8	1127*	82	0,085	0,073				
Leukozyten	negativ	19(57)*		2(6)*		49(147)*	5						
Nitrit	negativ	19	1	2		49	1						
pH	5	19	5	2		49	7						
Eiweiß	negativ	19(57)*	10	2(6)*	2	49(147)*	24						
Glucose	normal	19(57)		2(6)*		49(147)*	6						
Keton	negativ	19(57)*	3	2(6)*		49(147)*	10						
Urobilinogen	normal	19(57)*	6	2(6)*	3	49(147)*	13						
Bilirubin	negativ	19(57)*	10	2(6)*	3	49(147)*	13						
Blut (Erythrozyten) (Hämoglobin)	negativ	19(57)*	2	2(6)*		49(147)*	3						
Uricult*	negativ	18	5	2		43	11	0,26	0,26				
Keime	E. Coli: St. aureus:		5				10						
Blut:		129	26	14	2	428	73	0,20	0,17				
Leukozyten	6-12000	21	6	2		57	9	0,29	0,16				
Erythrozyten	5-8 Mio. (1)				(1)	11	1						
Senkung (24 Std.)	19-35 mm	17	6	2	1	50	15	0,35	0,30				
Harnstoff	20-50 mg%	21	2	2	1	62	17	0,10	0,27				
Alkalische- Phosphatase AP	-190 U/L	22	6	2		60	7	0,27	0,17				
Glutamat-Pyruvat- Transaminase GPT	20-40 U/L	21	5	2		61	18	0,24	0,30				
Glutamat-Oxalacetat- Transaminase GOT	-40 U/L	10		2		46	3	0	0,07				
Lactat-	-100 U/L	5	1	2		31	3	0,20	0,10				
Glutamat-													
Dehydrogenase LDH													
Dehydrogenase GLDH	- 6 U/L	7				28		0	0				
Gesamteiweiß GE	5-7 g%	5				22		0	0				

3.3.9 Nebenwirkungen

Schädliche Nebenwirkungen ließen sich in keinem Fall nachweisen. Bei 6 mit NeyChondrin behandelten Rüden trat Hypersexualität auf, das sind 19 % der mit NeyChondrin behandelten Hunde und 29 % aller mit NeyChondrin behandelten Rüden.

Vermehrte Freßlust wurde von 9 Patienten berichtet. Von diesen waren 3 mit NeyArthros, 5 mit NeyChondrin und 1 mit NeyArthros und NeyChondrin behandelt worden. Alle hatten Lingual-Präparate erhalten, die übermäßige Freßlust ließ nach Absetzen der Tropfen wieder nach. 1 Hund (Nr. 37) erbrach nach Verabreichung von NeyChondrin-Tropfen. Epileptiforme Anfälle traten bei einem Rüden auf (Nr. 42, s.S. 119). Dieser hatte die Anfälle allerdings auch vorher schon gehabt.

3.3.10 Verendete und euthanasierte Patienten

Insgesamt 6 Hunde sind innerhalb des Untersuchungszeitraumes verendet(4) oder wurden euthanasiert(2). Es sind dies die Fälle Nr. 3, 10, 11, 20, 29 und 42. Ein Zusammenhang mit der zytoplasmatischen Behandlung konnte indirekt nur in einem Fall vermutet werden (Nr. 42, s.S. 119). Auf die einzelnen Fälle wird bei den Fallbeschreibungen genauer eingegangen.

Die Zeitangaben am Rand der nachfolgenden Aufstellung bedeuten: 1. Zahl vor dem Schrägstrich = Zeit seit 1. Injektion Therapie B, 2. Zahl = Zeit nach letzter Injektion Therapie B. Wenn nur eine Zeit angegeben ist, so bedeutet dies, daß der Hund nur einmal 1 Injektion Sol bekommen hat.

1. Fall Nr. 3:
(s.S. 100) Siehe Fallbe- Euthanasiert
schreibung und 5 Monate/
pathologischen 3 Monate
Befund

2. Fall Nr. 10:
(s.S. 103) Collie, männl., Verendet
14 Jahre. Veren- 7 Monate
det nach Athe-
rom-Operation.
Vermutliche To-
desursache: Al-
tersschwäche und
Narkose

3. Fall Nr. 11:
(s.S. 104) Collie, männl., Verendet
3 Jahre. Veren- 7 Monate/
det. Herzversa- 2 Tage
gen, siehe patho-
logischer Befund.
Blutuntersuchung:
o.b.B.; Urinbe-
brütung E. Coli

4. Fall Nr. 20:
(s.S. 111) DSH-Mix, weibl. Verendet
10 Jahre. Veren- 6,5 Monate
det wegen Leber-
tumor, faustgroß

5. Fall Nr. 29:
(s.S. 113) Siehe Fallbe- Verendet
schreibung.
Verendet nach 12 Monate/
Insulinüberdo- 5,5 Monate
sierung, Todes-
ursache: Nieren-
versagen, siehe
pathologischer
Befund, Alter

6. Fall Nr. 42:
(s.S. 119) Langhaar-Dachs- Euthanasiert
hund, männl., 0,5 Monate/
10 Jahre. An- 6 Tage
häufung epilep-
tiformer Anfäl-
le und keine
Besserung der
Paralyse, schlaf-
fe Lähmung der
Hinterhand.

3.3.11 GESAMTÜBERSICHT Tabelle 15

- 94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	1	1	3	2	3	1	A	+	11	Rudel	80	30	3	0	3	0	2	0	X
2	1	1	1	2	4	2	H	+	4,5	Spindel	50	60	0	0	2	0	0	0	X
3	1	1	1	2	4	1	A	+	3	Münsterl.	250	60	0	2	1	0	1	0	X
4	3	1	1	2	5	1	H(S)	+	3	Münsterl.	/	135	/	18	/	2	/	2	/
5	3	1	1	2	3	2	H	+	2	Gold.Petr.	150	45	0	0	2	0	0	0	X
6	1	1	2	3	5	1	H	+	9	Boxer	/	60	/	0	/	2	/	2	/
7	1	1	2	3(2)	1	A	+	9	Boxer	75	D11	1	0	2	0	2	0	X	
8	3	1	2	3	5	1	A	-	7	Boxer	450	60	0	0	2	0	1	0	X
9	1	1	2	3	3	2	A(H)		6	Boxer	50	15	0	0	0	0	0	0	0
10	1	2	3	3	3	1	S		13	Collie	70	45	0	0	4	0	4	0	X
11	1	1	1	1	3	4	1	H		3	Collie	0	45	0	0	0	0	0	X
12																			
13	1	2	3	3	1	1	S(H)		10	DSH	150	45	0	0	8	1	8	1	X
14	1	2	2	3	3	1	S		8	DSH	150	15	0	0	2	0	2	0	X
15	3	2	2	3	4	1	S(H)		6	DSH	/	120	/	2	/	0	/	0	/
16	3	1	2	3	3	1	A	-	6,5	DSH	50	45	0	1	0	1	0	1	X
17	3	2	2	3	1	1	S	-	6	DSH	50	75	0	0	0	1	0	1	X
18	1	1	1	3	3	1	H(S)		4	DSH	0	15	0	0	0	0	0	0	0
19	1	1	1	3	3	1	H		3	DSH	50	15	7	4	0	0	0	0	X
20	1	1	3	3	1	2	A(S)		10	DSH-Mix	/	30	/	0	/	0	/	0	/
21	3	2	2	3	3	2	S		9	DSH-Mix	/	60	/	0	/	0	/	0	/
22	3	1	1	3	3	2	A		5	DSH	100	45	10	0	5	0	5	0	X
23	1	1	2	3	4	2	H	-	7	DSH-Mix	50	30	6	=	6	0	0	0	0
24	3	2	2	3	4	2	S(H)		6	DSH	125(50)180	5	0	6	1	5	0	X	X
25	3	1	1	3	3	2	H		3	DSH	/	195	/	6	/	1	/	1	/
26	1	1	2	3	4	1	H		8	Setter	50	45	0	0	1	0	0	0	X
27	1	1	2	3	5	1	A(H)		8	Setter	100	45	0	0	1	0	1	0	X
28	1	1	1	3	4	2	H		5	Setter	50	75	0	0	1	0	0	0	X
29	1	1	2	4	5	1	A		8	Dogge	450(50)60	5	1	0	0	0	0	X	X
30	1	1	1	4	4	1	A	4,5	Neufundl.	150	45	0	0	0	0	0	0	0	X
31	3	1	1	4	3	1	A		4	Bern.Samh.	250	45	0	0	4	0	0	0	X
32	1	1	1	4	3	1	A		1	Leibenger	100	15	0	0	1	0	0	0	X
33	1	1	2	4	3	2	A		7	Landseer	50	15	0	0	1	0	0	0	X
34	2	2	2	1	5	1	E		8	RHD	30	75	2	=	2	2	=	2	2
35	2	2	2	1	5	1	E		8	RHD	40	150	6	11	3	5	3	5	X
36	2	2	1	1	4	1	E	-	5,5	RHD	60	75	56	43	35	235	2	X	X
37	2	2	2	1	4	1	E		6	RHD	95(45)60	6	11	5	5	3	5	X	X
38	2	2	1	1	3	1	E		5	RHD	73	15	15	7	11	0	9	0	X
39	2	2	2	1	1	2	E		6	RHD	60(10)150	11	31	11	30	11	24	X	X
40	2	2	1	1	1	2	E		5	RHD	45(15)15	4	16	4	4	2	3	X	X
41	2	2	1	1	1	2	E		4	RHD	58	30	14	0	8	0	8	0	X
42	2	2	3	1	4	1	E	-	10,5	LHD	70	30	8	7	8	2	8	2	X
43	2	2	2	1	4	1	E		8	LHD	85	45	21	14	11	0	8	0	X
44	2	2	1	1	5	1	E		5	LHD	51	105	5	8	4	3	4	2	X
45	2	2	3	1	1	2	E		13	LHD	53	30	4	0	4	0	4	0	0
46	2	2	3	1	5	2	E		10	LHD	30(5)45	1	6	2	5	2	4	X	X
47	3	2	3	2	1	1	E		11	Beagle	75	45	14	1	4	0	3	0	X
48	3	1	3	3	1	1	H	-	12	Collie	150(100)45	3	0	3	2	2	1	X	X
49	1	1	1	3	5	1	H		1	DSH	50	15	0	0	1	0	0	0	X
50	3	1	1	3	3	1	H	1,5	DSH	50	60	0	3	1	1	1	1	X	X
51	2	2	3	1	1	1	E		13	LHD	60	45	6	5	5	0	4	0	X
52	1	1	2	3	3	1	H		6	Boxer	100	15	4	0	0	0	0	0	X
53	2	2	3	1	1	1	E(A)		10	LHD	100	15	24	0	11	0	11	0	X
54	3	2	3	1	1	1	E		12	RHD	53(20)75	12	5	8	3	7	3	X	X
55	100	T	3	1	1	1	E												

*am 100. Tag und 180. Tag noch Gruppe 1

*am 100. Tag noch Gruppe 1

21		22		23		24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Nr
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				A	B	
35	228	- 1	+4(4)	/	+ 4	/	+ 4														X 1
750	297	- 2	+3(4)	+ 1	+ 3	0	+ 3	X	X	O	A		X		O	C					X 2
146	148	- 4	+3(3)	+ 2	+ 3	/	/	X	X	X	A	B	B	X	X	C	E 148	94			X 3
/	396	/	+3(4)	/	+ 3	/	+ 2	X	/	X	B	B		X	/	X	/	C			H X 4
231	162	+ 2	+3(3)	+ 3	+ 3	+ 2	+ 3														F X 5
/	251	/	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3	/						/	/						X 6
421	222	0	+3(3)	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3														7
668	100	- 1	0(0)	+ 1	0	0	/														8
24	113	0	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3														X 9
712	221	- 2	+2(4)	+ 3	+ 3	+ 1	+ 2									V 210	203				X 10
198	215	- 1	+4(4)	+ 1	+ 3	- 1	+ 4	X	X	O	A		X	X	C	V 215	1				X 11
																					X 12
730	209	+ 2	+2(2)	+ 3	+ 3	- 2	+ 3														F X 13
90	231	+ 2	+3(4)	+ 2	+ 2	/	+ 2														X 14
/	385	/	+3(3)	/	+ 3	/	0	X	/	X	B	B		X	/	X	/	0			X 15
554	100	- 1	0(0)	+ 2	0	+ 3	/														16
11	100	0	0(1)	/	0	/	/														X 17
24	250	0	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3														X 18
214	57	0	+2(3)	+ 2	+ 2	+ 1	/														X 19
/	91	/	+2(4)	/	+ 2	/	/	X	/	X	B	B	B	/	/	/	V 171	171	-		X 20
/	203	/	+3(4)	/	+ 2	/	+ 3	/						/	/						21
45	71	0	+3(3)	/	+ 3	/	/														X 22
/	100	/	0(0)	/	0	/	/	X	0	0			X		0	0					X 23
374	420	0	+3(3)	0	+ 2	+ 2	+ 1	X	X	0			X	X	0	S					X 24
/	192	/	+2(3)	/	+ 2	/	+ 3	/					/	/	/						25
10	372	+ 2	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3	X	X	X	B	B	A	X		0	0				X 26
366	218	- 1	+3(4)	+ 3	+ 4	+ 3	+ 3														F X 27
44	234	+ 2	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3	X	X	X	A	AB	X	X	X	C	0				F X 28
601	365	+ 1	+3(3)	+ 3	+ 3	+ 2	+ 3	X	X	X	AB		X	X			V 365	161			X 29
48	328	0	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3	X	X	X	B	A	/								X 30
79	165	0	+3(4)	0	+ 3	/	+ 3														X 31
14	232	0	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3								C						X 32
30	109	+ 1	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3														X 33
/	406	/	+3(3)	/	+ 3	/	+ 3	X	X	O	A		A	X		0	0				HF X 34
10	278	0	+3(3)	/	+ 3	/	+ 3	X	X	O		A	A	X	X	O	C				X 35
110	419	0	0(+1)	0	+ 1	/	0	X	X	X	AB		A	X	X	C	/				HF X 36
397	295	0	+4(4)	+ 3	+ 3	+ 2	+ 4	X	O	X		B	B	X	O	X					HF 37
63	54	0	+3(3)	/	+ 3	/	/														38
10	592	0	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3	X	O	X	B		B	X	O	X	O	C			F X 39
3	280	0	+3(3)	/	+ 2	/	+ 3														X 40
372	42	0	+3(3)	+ 3	+ 3	+ 3	/														X 41
9	19	+ 1	0(+1)	/	/	/	/	X	X	/			A	X		C	/	E	19	6	HE 42
333	330	0	+3(4)	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	X	X	O			A	X	X	C	0				43
72	388	0	+4(4)	/	+ 4	/	+ 4	X	O	X	B			X	X						HF 44
10	327	+ 1	+4(4)	/	+ 4	/	+ 4														X 45
7	399	- 3	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3	X	X	O	A		A	X		C(C)					X 46
194	117	+ 1	+3(4)	+ 2	+ 3	+ 1	+ 3														47
223	100	+ 1	0(0)	+ 2	0	+ 1	/														48
85	245	0	+3(4)	0	+ 3	/	+ 3														49
35	102	0	+2(3)	/	+ 2	/	/														X 50
717	298	0	+3(4)	+ 2	+ 3	+ 2	+ 3														51
178	251	+ 1	+3(3)	0	+ 3	+ 1	+ 3														X 52
52	256	0	+3(4)	/	+ 3	/	+ 3														E X 53
518	366	0	+3(4)	+ 2	+ 3	+ 2	+ 3									C					54

3.3.11 Schlüssel zur Gesamtübersicht

Spalte

1	Patientennummer	
2	Therapiegruppe	1 NA = NeyArthros ^R 2 NC = NeyChondrin ^R 3 NAC = NeyArthros ^R und NeyChondrin ^R
3	Diagnosegruppe	1 A = Arthropathia deformans 1 H = Hüftgelenksdysplasie 2 S = Spondylo- o. Spondyl- arthropathia deformans 2 E = Enchondrosis interver- tebralis
4	Altersgruppe	1 = 1 - 5 Jahre 2 = 6 - 9 Jahre 3 = 10 - 13 Jahre
5	Rassegruppe	1 = Kleine Rassen 2 = Mittlere Rassen 3 = Große Rassen 4 = Schwere Rassen
6	Therapiemodus (Grundtherapie)	1 = 1 - 2 x Sol 2 = 5 x Dil 3 = 5 x Dil + 1 x Sol 4 = 5 x Dil + 2 x Sol 5 = 1 - 2 x Sol + 5 x Dil + 1 - 2 x Sol
7	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich
8	Diagnose	A = Arthropathia deformans H = Dysplasia acetabuli S = Spondylopathia oder Spondyloarthropathia de- formans E = Enchondrosis interver- tebralis

Spalte

- 9 Alter bei Behandlungsbeginn (Therapie B)
- 10 Rasse (DSH = Deutscher Schäferhund
RHD = Rauhaardackel
LDH = Langhaardackel)
- 11A Gesamtmenge Prednisolon während Therapie A (mg)
- 11B Gesamtmenge Sol (Trockensubstanz) während
Therapie B (mg)
- 12A Anzahl Magnetfeldbestrahlungen Therapie A
- 12B Anzahl Magnetfeldbestrahlungen Therapie B
- 13AB Anzahl B₁₂-Injektionen Therapie A_B
- 14AB Anzahl Impletol^R-Injektionen Therapie A_B
- 15 Phenylbutazon (oral) während Therapie A
- 16 Lingual-Präparate oral während Therapie B
- 17 Operative Maßnahmen: M = Partielle Myoektomie
der Mm. pectinei
F = Fascientransplantation
Op, Anzahl der Tage bis Beginn Therapie B
- 18A Anzahl Rezidive bis 100. Tag Therapie A
- 18B Anzahl Rezidive bis 100. Tag Therapie B
- 19A Anzahl Rezidive bis 180. Tag Therapie A
- 19B Anzahl Rezidive bis 180. Tag Therapie B
- 20A Anzahl aller Rezidive Therapie A bis Tag E
- 20B Anzahl aller Rezidive Therapie B bis Tag E
- 21A Beobachtungsdauer Therapie A (bis Beginn
Therapie B = Tag E)
- 21B Beobachtungsdauer Therapie B (bis 31.03.86 bzw.
Todestag bzw. 100. Tag bei den Patienten, deren
Besitzer eine Weiterbehandlung mit Therapie B
nicht wünschten = Tag E)

Spalte

- 22A Bewertung Therapie A (an Tag E)
- 22B Bewertung Therapie B (an Tag E)
in Klammern: (Besitzerbewertung)
- 23A Bewertung Therapie A am 100. Tag
- 23B Bewertung Therapie B am 100. Tag
- 24A Bewertung Therapie A am 180. Tag
- 24B Bewertung Therapie B am 180. Tag
- 25 Blutuntersuchungen
- 26A Negative Veränderungen während Therapie A
- 26B Negative Veränderungen während Therapie B
- 27 Erythrozyten, Leukozyten, Senkung
- 28 Harnstoff, Creatinin
- 29 AP, GPT, GOT, LDH, GLDH
- 30 Urinuntersuchungen
- 31A Negative Veränderungen während Therapie A
- 31B Negative Veränderungen während Therapie B
- 32A Uricult^R positiv während Therapie A
- 32B Uricult^R positiv während Therapie B
C = E. coli; S = Staph. aureus
- 33 Todesart: E = Euthanasie
V = Verendet
- 34 Tage nach 1. Injektion Therapie B
- 35 Tage nach letzter Injektion Therapie B
- 36 Begleiterscheinungen während Therapie B
H = Hypersexualität
F = Freßsucht
E = Epileptiforme Anfälle
- 37 Röntgen-Aufnahmen vorhanden

3.3.12 Kasuistik

Für die Fallbeschreibungen wurden einige Repräsentativfälle, sowie die Fälle herausgesucht, die sich entweder nicht gebessert haben und/oder verendet sind bzw. euthanasiert werden mußten.

Erklärung der in den Fallbeschreibungen verwendeten Abkürzungen und Zahlen:

64 = NeyGeront

65 = NeyNormin

68 = NeyChondrin

43 = NeyArthros

83 = Neyarthros-Liposome (Tropfen)

TS = Trockensubstanz

Sol = Sol (Solubile)-Präparation

Zyt.Ther. = Zytoplasmatische Therapie

Med = Medivitan

Impl = Impletol

Pred = Prednisolon

Mgf = Magnetfeldtherapie

Phen = Phenylbutazon ((Delta) Butazolidin, Arthri-Dog)

Dex = Dexamethason

Primod = Primodian^R (Schering AG, Berlin) = 4 mg
Exstradiolvalerat + 90,3 mg Testosteron-
anthat

Bew = Bewertung

A = Tag innerhalb Therapie A
(z.B. A₁ = 1. Tag Therapie A)

B = Tag innerhalb Therapie B
(z.B. B₁ = 1. Tag Therapie B)

Nr.: 3 Rasse: Kleiner Münsterländer Geschl.: ml

Alter: 3 J. b. Beh.-beginn.

Vorbeh. seit: 27. 03. 84

Diagnose: Arthropathia deformans Ellbogengelenk links

Zyt. Ther. 1 Tag: 17. 08. 84

Tag	Dilution Nr.	Ts/Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.	Bew.
A 1	lahmt vorne	links; Schmerz auslösbar Ellbo- gengelenk		50 i.a.			Rö.	
15								+ 2
106							Rp. Phe- nylbuta- zon	+ 1
115				50 i.m.				- 3
116				50 i.m.				
117				50 i.m.				
139				50 i.m.	Med.	2ml		- 3
143								
B 1	43/II,68/II s.c.							
3	43/II,68/II s.c.							
5	43/II,68/II s.c.							
7	43/II,68/II s.c.						Vit. ADE i.m.	
9	43/II,68/II s.c.				40/25		Vit. ADE i.m.	+ 1
11		43,68 je 15mg i.m.			50/50			+ 1
14		43,68 je 15mg i.m.						+ 2
50	43/III,68/III s.c.							
51	43/III,68/III s.c.							
52	43/III,68/III s.c.							
53	43/III,68/III s.c.							
54	43/III,68/III s.c.							
144	Erbrechen,	frißt nicht					Blut: Harnst: 221 mg% Urin: Eiw. 3 + E. coli	+ 3
148	Euthanasie wegen ständigen Erbrechens und Urämie.	Ursache: Vermutlich Corticoidüberdosierung, Immunschwäche (Coli) Nieren:					Blut: Harnst: 210 mg%	
		s. Sektionsbefund S.101						

Sektionsbefund zu Fall Nr. 3:

Hochgradige Nephritis interstitialis,
herdförmige Nephritis fibro-vesiculosa,
hochgradige Glomerulofibrose mit Hyalinisierung
der Kapillarschlingen sowie massiver Amyloidab-
lagerungen im Bereich der Glomerula sowie intra-
tubulär.

Nr.: 8 Rasse: Boxer Geschl.: ml Alter: 7 J. b. Beh.-beginn. Vorbeh. seit: 0 5. 0 1. 8 4 Zyt. Ther. 1. Tag: 0 8. 1 1. 8 5

Diagnose: Sekundäre Arthropathia deformans nach Trauma

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.	Bew.
A 1	Distorsion (Kapselriß?) Kniegelenk links nach "Rauferei"			50 i.m.	1 ml			+2/0
45				50 i.a.			Rp. Phen.	+2/0
146				50 i.a.			Phen.	0
182							Fascien-transplantation	+2
245				50 i.a.			Phen.	0
262				50 i.a.			Phen.	0
409				50 i.a.			Rö.?	0
538				50 i.m.	2 ml	2ml	Phen.	+2/0
616				50 i.a.				0
664				50 i.a.				-2
668=								-1/-
B 1		64/68 je 15mg i.m.						
11	43/II s.c.							
12	43/II s.c.							
13	43/II s.c.							
14	43/II s.c.							0
15	43/II s.c.							
17		43/15mg i.m.						
19		43/15mg i.m.						0
100	Abbruch							
A(116) 2				50 i.m.				

Keine Besserung innerhalb der 3 Monats-Frist, zwischendurch aber auch keine Intensivierung oder Wiederholung der Therapie. Wahrscheinlich ist das Gelenk so zerstört (innerhalb von 2 Jahren allein 350 mg Prednisolon intraartikulär), so daß für Selbstheilungsvorgänge kein Ansatzpunkt mehr da ist.

Nachtrag zum Oktober 1986: Nach nochmaliger Wiederholung der Therapie hat sich der Hund nunmehr noch einmal 3 Monate später, so gebessert, daß er fast lahmheitsfrei läuft.

Alter: 13 J. b.Beh.-beginn.

Vorbeh. seit: 0 1. 1 0. 8,3

Zyt.Ther.1.Tag: 2 0. 0 8. 8 5

Diagnose: Spondylopathia deformans, Altersarthrose

[illegible]

Sektionsbefund zu Fall Nr. 5:

Ernährungszustand: gut

Stauungslunge

Herzkammern dilatiert und prall mit Blut gefüllt

Petechiale Blutungen um die großen Herzgefäße

Herzmuskulatur: Deutliche Aufhellungen auf den
Schnittflächen.

Herzklappen obB

Stauungserscheinungen in den übrigen Organen.

Histologie:

deutliche Herzmuskelentzündung, Herzmuskelödem
und degenerative Veränderungen an den Herzmuskel-
fasern.

Akute Lungenentzündung

Bakteriologisch keine Keime anzüchtbar

Hemmstofftest positiv

unspezifisches Keimwachstum im Darmtrakt

Parasitologische Untersuchung negativ.

Tod durch akutes Herzversagen infolge der Herz-
muskel- und Lungenentzündung.

Bemuskelung physiologisch

Makro- und mikroskopisch keine von der Norm ab-
weichenden Veränderungen in Hirn, Rückenmark,
Knochen, Bandscheiben und Gelenken nachweisbar.

Deutlich verkleinerte Nebennieren.

Tag	Dilution Nr.	Ts/ Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf. B12	Impl.	Bew.
B 1	lahmt nach Aufstehen 43/II s.c.						Rö. Blut: Harnst.: 54 mg% Urin:o.b. B.
5	43/II s.c.				40/50		
6	43/II s.c.						
7	43/II s.c.				50/50		
9	43/II s.c.						
12		43/15mg i.m.					
15		43/15mg i.m.					
18							Blut: Harnst.: 50 mg% Urin:o.b. B. + 2
64	Durchfall und Erbrechen						0
109		43/15 mg i.v.	Rp. 83				Blut: BKS:55mm Harnst.: 50 mg% + 2
143							+ 1
186							Blut: BKS:63mm Urin: Eiw. 2+ Ket.:2+ Urob.:2+ Bilir.:2+ Rö + 2
217		43/15mg i.m.					+ 2
239		43/30mg i.v. 68/15mg i.m. 65/15mg i.m.					Blut: BKS:38mm Harnst.: 50 mg% + 1
276							Blut: BKS:58mm Leuk:12300 Harnst.: 75 mg% + 3
385	(31.03.86)	wetterföhlilig, lahm geringgradig nach starker Belastung. Die Hauptursache für die Beschwerden liegt wahrscheinlich eher im Wirbelsäulenbereich, da sich der Hund erst nach Gabe von NeyChondrin-Sol zufriedenstellend gebessert hat.					

[illegible]

Nr.: 17 Rasse: DSH

Geschl.: ml Alter: 6 J. b.Beh.-beginn.

Vorbeh.seit: 2 4. 1 0. 85

Diagnose: Spondylopathia deformans oder
Pachymeningitis ossificans-Verdacht

Zyt.Ther.1.Tag: 0 4. 1 1. 85

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.		Bew.
A 1		kann nicht hochspringen/Treppen steigen, schreit spontan, kein Schmerz auslösbar		50 i.m.	Med.	2ml	Rö		
11	=								0
B 1		43/68 je 15mg i.m. Rp. 65/68/83							
8		43/30 mg i.m. 68/15 mg i.m.							
100		Abbruch, allgemein munterer, versucht zu spielen, schreit spontan beim Springen. Besitzer: "Der Hund ist im Kopf jünger geworden und im Rücken ein alter Mann geblieben".							

Nr.: 19 Rasse: DSH Geschl.: ml Alter: 3 J. b.Beh.-beginn.
 Diagnose: HD II - III/ Arthropathia deformans Knie- Vorbeh.seit: 0 4. 0 7. 8 5
 Zyt.Ther.1.Tag: 0 3. 0 2. 8 6

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.	Bew.
A 1	lahmt hinten	links	Vorbehandelt anderer Tierarzt					
30				50 i.a.			R8 Rp. Phen.	0 + 2
163				40/50				0
164				50/50				
165				60/50				
166				80/50				
167				100/50				
168				160/50				
169				100/50				+ 2
244	=							0
B 1	43/II i.a.+s. c.		Rp. 65/68/83	100/50				
2	43/II s.c.			100/50				
3	43/II s.c.			100/50				+ 2
5	43/II s.c.			100/50				+ 2
9	43/II i.a.+s. c.							0
16		43/15mg i.m.						+ 2
51								+ 3
56	(31.03.86)	lahmt geringgradig nach Aufstehen, Schmerz geringgradig auslösbar Knie- gelenk links.						+ 3

[illegible]

[illegible]

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf. B12	Impl.	Bew.
A 1	Kreuzbandriß links, Krepitation			50 i.a.		Rp. Phen. Mobilat	
15				50 i.a.		Rp. Phen. Mobilat	+ 2
28				50 i.a.		Rp. Phen. Mobilat	0
49				50 i.a.		Rp. Phen. Mobilat	+ 2
222				50 i.a.		Rö. Rp. Phen.	0
236	lahmt hinten rechts			50 i.a.		Rp. Phen.	
300				50 i.a.			0
581				50 i.a.			0
590				50 i.a.	50/50		0
594					60/50		
596					80/50		
601	=				100/50		
B 1		43/15mg i.v.	Rp. 83		100/50	Blut: Harnst.: 67 mg%	
3	43/II						
5	43/II						
8	43/II						
10	43/II						
12	43/II						
15		43/15mg i.m.					
-							
17						Blut: Leuk.: 12500 Harnst.: 33 mg% BKS: 39	
58						Rö.	+ 2

Nr.: 29 Rasse: Deutsche Dogge Geschl.: ml Alter: 8 J. b.Beh.-beginn.
Vorbeh.seit: 1 1. 0 4. 8 3
Diagnose: Arthropathia deformans Kniegelenk beider- Zyt.Ther.1.Tag: 1 1. 0 3. 8 5
seits

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.		Bew.
183		43/15mg i.v.	Rp. 68/83/64/65 67 (NeyGluc) 96 (NeyTroph) 63 (NeyNeparin)	100/50				Urin: Eiw. 3+ Gluc:3+ Blut: Harnst.: 63 mg% Creat.: 2,5 mg%	+ 3
B204		43/15 mg i.m.		50 i.a.				Rö. Blut: Harnst.: 79 mg% Creat.: 3,2 mg%	0
360									+ 3
365		Vormittag: Insulin-Injektion (50 E) Nachmittags: verendet nach längerem Spaziergang Sektionsbefunde						Urin: Eiw. 3+ Gluc:4+ Blut: Eryth: 5,2 Mio. Harnst.: 175 mg% Creat.: 4,2 mg% GPT: 79 μ /l Gluc: 63 mg (normal) BKS: 78	
		1. Niere: chronisch-membranöse Glomerulonephritis mit vollständigem Untergang zahlreicher Glomerula. Milz: mäßiger pulpös-hyperplastischer Milztumor, deutliche Hämosiderose, mittelgradige Stauungshyperämie. Pankreas: obB. Leber: vakuolige Degeneration, tropfige Verfettung von Leberzellgruppen.							
		2. Niere: Glomerulofibrose, Pyelitis, Nephritis interstitialis non purulenta, herdf. Tubulonekrose, hyaline, intertubuläre Zylinder. Milz: Hämangiom, Stromahämosiderose. Pankreas: obB. Leber: Fibrose, Sternzellhämosiderose, intrahepatische lymphohistiozytäre Infiltrate, hydropische Degeneration der Hepatozyten, multiple Nekrosen und Nekrobiosen.							

Nr.: 36 Rasse: RHD Geschl.: ml Alter: 5 1/2 b. Beh.-beginn. Vorbeh. seit: 1 9. 1 0. 8 4 Zyt. Ther. 1 Tag: 0 6. 0 2. 8 5

Diagnose: Enchondrosis intervertebralis (Paralyse der Hinterhand)

Tag	Dilution Nr.	Ts / Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.	Bew.
A 1	Rezidiv vom 11.07.83, sehr schmerzhaft Paralyse			20 i.m.				Blase entl. 0
2				40/50	2ml	2ml		
3				10	50/50	2ml	2ml	" " 0
4					60/50	2ml	2ml	" " 0
5					80/50	2ml	2ml	" " 0
6					100/50	2ml	2ml	" " 0
7					100/50	2ml	2ml	" " 0
8					100/50	2ml	2ml	" " 0
9				8i.m.	"	"	"	" " 0
10					"	Med.	"	" " 0
11				12i.m.	"	2ml	"	" " 0
12				10i.m.	"	"	"	" " 0
13					"	"	"	" " 0
14					"	"	"	" " 0
15					"	"	"	" " 0
16					"	"	"	" " 0
17					"	"	"	" " 0
18	+ 1 Inj. Arumalon ^R 0,5 ml				"	"	"	" " 0
19	+ 1 Inj. Arumalon 1,0 ml				"	Med.	"	" " 0
-26					"	2ml	2ml	Urin: Coli
-109		" 9 x			6x	6x	6x	E.coli
					"	"	"	"
110					29x	9x	9x	tägl.
B 1	68/II s.c.	R0	Rp. 68					0
3	68/II s.c.							Blut:
								Leuk.:
								12000
5	68/II s.c.			100/50				GPT: 53,3 μ /l
7	68/II s.c.							Urin:
								Nitrit: 3+
9	68/II s.c.			100/50				pH: 8
								Uricult:
								E.coli
11		68/15mg i.m.						
14		68/15mg i.m.						
15								Blut:
								Leuk.:
								16400
-56					8x			GPT: 46,1 μ /l
57		68/15mg i.m.	Hypersex	100/50				+ 1
-103				11x				
106		43/68 je 15mg i.m.		100/50				Lasix

Nr.: 42 Rasse: LDH Geschl.: ml Alter: 10,5 J. b. Beh.-beginn.
 Vorbeh. seit: 0 2. 0 2. 8 5
 Diagnose: Enchondrosis intervertebralis (Paralyse der Hinterhand) Zyt. Ther. 1. Tag: 1 1. 0 2. 8 5

Tag	Dilution Nr.	Ts/Sol Nr.	Lingual Nr.	Pred mg	Mgf.	B12	Impl.	Bew.
A 1	nicht gehfähig			25 i m.				Blase entl.
2				40/50				" " " "
3				20 i 50/50	"	"	"	" " " "
4				15 i m.	"	"	"	" " " "
5				10 60/50	"	"	"	" " " "
6				80/50	"	"	"	" " " "
7				100/50	"	"	"	" " " "
8				100/50	"	"	"	" " " "
9				100/50	"	"	"	" " " "
10								Uricult: E. coli Blut: GPT: 92,3 u/l AP: 1856 u/l
B 1	68/II				"	"	"	Blase entl. 0
2					"	"	"	uriniert + 1
3	68/II				"	"	"	selbst
4	68/II				"	"	"	
5	68/II				"	"	"	
7	68/II				"	"	"	
10		68/15mg i.m.			"			
13		68/15mg i.m.	Hypersex.		"			Blut: GPT: 250,3 u/l GOT: 48 u/l AP: 3054 u/l
17	epileptiforme Anfälle/Hypersex					Med. 2ml		
19	Status epilepticus (Gehirntumorverdacht) Euthanasie auf Wunsch des Besitzers (wirtschaftliche Gründe). Wahrscheinlich hing die Epilepsie mit der Hypersexualität zusammen. Diese könnte wiederum durch den in Neychondrin enthaltenen Hodenanteil ausgelöst worden sein.							0

Nr.: 48 Rasse: Collie

Diagnose: HD II-III + Altersarthrose

Geschl.: m Alter: 12 J. b.Beh.-beginn.
Vorbeh.seit: 0 2. 0 5. 84
Zyt.Ther.1.Tag: 1 2. 1 2. 84

[illegible]

3.3.13 Bildteil

Der Originalarbeit sind Röntgenaufnahmen der Fälle 3, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 23, 29, 36 sowie Sektionsfotos des Falles Nr. 11 (Fotos: Staatl.Vet.Untersuchungsamt Krefeld) beigelegt. Auf den Abdruck dieser Bilder wurde aus Kostengründen mit Zustimmung des Dekans der Tierärztlichen Fakultät der Universität München verzichtet.

Die Röntgenaufnahmen können an der Tierärztlichen Klinik Dr. W. Müller in Wuppertal, die Fotos in der Originalarbeit beim Verfasser eingesehen werden.

3.4 Diskussion

Zur Methodik:

Auf einen Doppelblindversuch wurde aus forensischen und praktisch-wirtschaftlichen Gründen verzichtet, da es sich um Patienten einer Privatklinik handelte. Man kann weder vom Therapeuten, der seine Klienten nicht verlieren will, noch vom Tierhalter die Zustimmung zu einer aufwendigen, aber evtl. (bei Placebogaben) unwirksamen Therapie verlangen. Der Besitzer bringt sein Tier ja in die Klinik, damit ihm geholfen werde und nicht um ihm wirkungslose Medikamente injizieren zu lassen damit die Wirksamkeit eines anderen Präparates, das aber ein anderer Patient erhalten hat, dadurch nachgewiesen werde. Jeder Tierhalter, der davon Kenntnis erhielt, würde zu Recht Regreßansprüche stellen.

In der Tiermedizin kann die Applikation eines Placebos auch deshalb unterbleiben, weil der Patient (das Tier) ohnehin nicht weiß was ihm verabreicht wird und sich deshalb auch aufgrund der Wirksamkeit des Medikamentes bessert und nicht, weil er glaubt, ein wirksames Medikament erhalten zu haben.

Die Wirksamkeit der zytoplasmatischen Präparate ist in der Literatur eingehend beschrieben, so daß nicht befürchtet werden brauchte, eine völlig unwirksame Therapie anzuwenden. Zudem waren 45 Hunde (84,9 %) bereits ohne befriedigendes Ergebnis vorbehandelt, so daß in der zytoplasmatischen Therapie eine letzte Möglichkeit gesehen wurde,

die Beschwerden dieser Hunde doch noch zu lindern. Der Erfolg hat die durch die Literatur geweckten Hoffnungen schließlich bestätigt und die Bedenken und Vorbehalte beseitigt.

3.4.1 Therapiegruppen

Will man die 3 Therapiegruppen miteinander vergleichen, so ergibt sich das Problem, daß anhand dieser Untersuchungen nicht festzustellen ist, ob sich die Patienten in Therapiegruppe 3 (Ney-Arthros + NeyChondrin) wegen NeyArthros oder wegen NeyChondrin oder wegen der Kombination aus beiden gebessert haben.

Für 3 Patienten kann als gesichert gelten, daß sie sich mit NeyArthros allein nicht befriedigend gebessert haben. Erst nach zusätzlicher Applikation von NeyChondrin besserten sich die Beschwerden. Aber auch hier muß ungeklärt bleiben, ob sie sich wegen der NeyChondrin-Injektion oder wegen der Kombinationstherapie gebessert haben. Immerhin haben sich von den ursprünglich 6 Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen die nur mit NeyArthros behandelt wurden 3 Hunde auch ohne zusätzliche Gabe von NeyChondrin gebessert.

Absolut falsch wäre die Schlußfolgerung aus den Tabellen 1 - 3, daß eine Therapie mit NeyArthros wegen der 95 %igen Erfolgsquote der Therapie mit NeyChondrin (87 %) oder der Kombinationstherapie (75 %) überlegen sei.

In Gruppe 3 z.B. finden sich auf der Negativseite allein 4 der 6 Patienten, deren Besitzer eine Weiterbehandlung ablehnten und die deshalb nur bis zum 100. Tag beobachtet wurden. Deshalb liegt hier die Erfolgsquote am 180. Tag ja auch bei 100 %.

Richtiger ist es, die Patienten aus Gruppe 3 vor der Endbeurteilung auf Gruppe 1 und 2 entsprechend der Diagnosestellung aufzuteilen.

Hierbei ergibt sich für Gruppe 1:

Gebessert 28 = 87,5 %

Unverändert 4 = 12,5 %

und für Gruppe 2:

Gebessert 18 = 85,7 %

Unverändert 3 = 14,3 %

Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem Gesamtergebnis, so kann man sagen, daß beide Medikamente (NeyArthros und NeyChondrin) einander gleichwertig gegenüberstehen, wobei die Besserungsrate für NeyArthros etwas höher liegt.

Die Beeinflussung von Krankheitsverlauf, Folgeerscheinungen und Rezidivhäufigkeit muß für die Discopathie im Vergleich zur Arthropathie als wesentlich komplizierter und aufwendiger angesehen werden, da es sich bei der Arthropathie um eine protrahierende, im Frühstadium erkennbare Erkrankung, bei der Discopathie jedoch in ihrem klinischen Erscheinungsbild um ein plötzlich auftretendes, einem traumatischen Insult vergleichbares Geschehen handelt. Die Therapie mit NeyArthros setzt am Ort der Ursache für die schmerzhaften Folgeerscheinungen der Arthropathie an. Ihr Erfolg läßt sich messen am Nachlassen der Lahmheiterscheinungen, Schmerzhaftigkeit und - über Jahre - evtl. auch an der Regression der röntgenologisch nachweisbaren arthrotischen Veränderungen. Anders bei der Therapie mit NeyChondrin im Rahmen von Discopathien. Hier läßt sich der therapeutische Erfolg nicht so sehr am schnellen Nachlassen

von Schmerzen oder gar Parese- oder Paralyseerscheinungen messen (das Unterlassen einer Therapie mit Corticosteroiden beim akuten Discusprolaps ist sogar als Kunstfehler einzustufen), sondern vielmehr an einer deutlichen Verringerung der Rezidivhäufigkeit.

Daß sich beide Medikamente, NeyArthros und Ney-Chondrin, sinnvoll ergänzen können, kann nicht nur aus ihrer Zusammensetzung und ihren therapeutischen Angriffspunkten sprich: Erfolgsorganen geschlossen werden, sondern zeigen auch die Ergebnisse dieser Arbeit und die Veröffentlichungen anderer Autoren (KRAFT 1980; SCHLOSSAREK 1980; KNECHT 1982; LACHNIT 1983; KLÜMPER 1983; WANDERKA 1985; BRAUN 1986; JACOBS 1986).

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und der Ergebnisse dieser Arbeit kann für beide Medikamente eine hochgradige Wirksamkeit angenommen werden.

3.4.2 Diagnosegruppen

Um die zytoplasmatische Therapie erfolgreich einsetzen zu können ist offensichtlich eine genaue, auch Nebenfunde berücksichtigende Diagnosestellung unerläßlich. Gerade bei der Arthropathia deformans handelt es sich um ein komplexes Geschehen, das eigentlich immer als sekundäre Folgeerscheinung einer Erkrankung anderer Organe bzw. eines Traumas auftritt. Umsomehr muß bei der Befunderhebung detailliert nach den Ursachen geforscht werden. Diese können in einer Fehlstellung der Gliedmaßen, in einer degenerativen Verän-

derung der Wirbelsäule, aber auch in Erkrankungen der stoffwechselaktiven Organe (z.B. Niere, Leber usw.) zu finden sein. Im Präparat NeyChondrin mit seiner Kombination diverser Organsubstanzen ist dieser Tatsache Rechnung getragen worden.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Arbeit und des eben gesagten darf vermutet werden, daß bei einer exakten Diagnosestellung und entsprechendem gezieltem Einsatz der zytoplasmatischen Präparate die Aussichten auf einen therapeutischen Erfolg als überdurchschnittlich hoch angesehen werden können.

3.4.3 Alter

Die jüngeren Hunde (Gruppe 1) reagierten auf die Behandlung mit zytoplasmatischen Präparaten am besten (Besserungsrate 95 %). Die Altersgruppen 2 und 3 liegen mit 81 % und 83 % unter dem allgemeinen Besserungsdurchschnitt. Dies bestätigt die in der Literatur gemachten Angaben, wonach sich ein jugendlicher Organismus besser regeneriert als ein älterer (KNECHT 1985). Dies liegt vermutlich an der höheren und schnelleren Stoffwechselaktivität des jüngeren Organismus.

Die 3 Patienten aus Therapiegruppe 1, die später in Therapiegruppe 3 weiterbehandelt wurden (s. S. 52) gehören alle der mittleren Altersgruppe an. Hier finden sich auch die meisten der Patienten, deren Beschwerden unverändert geblieben sind. Als Ursache hierfür darf vermutet werden, daß die Beschwerden eines Hundes der mittleren Altersklasse als Folgeerscheinungen von Fehlstel-

lungen und Erkrankungen auftreten, die schon im jugendlichen Alter beginnen, aber sich erst nach einigen Jahren bemerkbar machen und manifestieren. In den meisten Fällen führen solche Folgebeschwerden sehr bald zur Euthanasie der Hunde. Eine Bestätigung dieser Hypothese ergibt sich aus dem Bezug zwischen Alter und Diagnose innerhalb dieser Arbeit (s.S. 53). Die jüngeren Hunde litten häufiger unter Hüftgelenkdysplasie und Arthropathia deformans, während bei älteren Hunden eher Wirbelsäulenerkrankungen diagnostiziert wurden.

In der mittleren Altersgruppe sind die Diagnosegruppen zu gleichen Anteilen vertreten. Die meisten Hunde mit Hüftgelenkdysplasie kommen vermutlich über die mittlere Altersgruppe nicht hinaus, weil sie vorher getötet werden müssen.

Bei mindestens 4 Hunden (Nr. 3, 19, 26 und 27) aus Altersgruppe 1 und 2 konnten die wegen der Intensität der Beschwerden, die sich auch mit den Maßnahmen aus Therapie A nicht befriedigend beeinflussen ließen, in Erwägung gezogene Euthanasie mit der zytoplasmatischen Therapie vermieden werden. Nr. 3 mußte später wegen Nierenversagens (s.S. 100) eingeschläfert werden. Die 3 anderen Patienten laufen inzwischen völlig lahmheitsfrei.

Aus diesem Grunde ist es wichtig, Erkrankungen des jungen Hundes, die Jahre später Folgeerscheinungen nach sich ziehen können (z.B. Hüftgelenkdysplasie, Polyarthritiden usw.) rechtzeitig, d.h. noch vor Auftreten erster Lahmheitserscheinungen zytoplasmatisch zu behandeln. Auf eine akute, bakterielle (Poly-)Arthritis folgt meistens,

auch nach anfänglicher erfolgreicher antibiotischer Therapie, einige Zeit (z.T. Jahre) später eine Polyarthrititis rheumatica chronica (DROMMER 1981; HOFFMANN 1979 - 86). Beim alten Hund liegt die Ursache der Beschwerden eher in Abnutzungerscheinungen. Der alte Hund verliert seine Regenerationsfähigkeit. Ein Hund, der mit 1 Jahr bereits eine mittlere bis schwere Hüftgelenkdysplasie hat, wird die daraus resultierenden Beschwerden selten erst mit 12 Jahren bekommen.

8 der 12 Patienten aus Altersgruppe 3, das sind 66,67 %, wurden ausschließlich mit Sol-Präparaten behandelt. Von diesen hat sich nur einer nicht gebessert, das entspricht dem Gesamtdurchschnittsergebnis. Dies bestätigt Angaben aus der Literatur (HARWARDT 1985), wonach beim alten Patienten wegen der herabgesetzten Immunitätslage eine Vorbehandlung mit Dilutionen zum Aufbau einer immunogenen Toleranz nicht notwendig ist.

3.4.4 Rassegruppen

Die kleinen und mittelgroßen Rassen liegen in der Besserungsrate mit 91 % über, die großen und schweren Rassen mit 84 % Besserung unter dem Gesamtdurchschnitt. Vermutlich liegt das daran, daß auch die applizierte Menge des zytoplasmatischen Präparates pro Kilogramm Körpergewicht eine Rolle spielt. Die Größe der Organzellen ist in jedem Individuum die gleiche, aber die Anzahl der Zellen steigt proportional mit der Größe des Körpers. So steht mit 1 Ampulle Trockensubstanz mit 15 mg Inhalt (die Tagesmaximaldosis beträgt nach Angaben der Firma vitOrgan 3 bis

5 mg pro Kilogramm Körpergewicht) bei einem kleinen Hund relativ mehr Substanz für die Organregeneration zur Verfügung als bei einem großen.

Aus der Rassedisposition für einzelne degenerative Erkrankungen (Teckel-Discopathie; Deutscher Schäferhund - Hüftgelenkdysplasie) ergibt sich auch als Ergebnis dieser Arbeit die Empfehlung, bei Hunden, bei denen aufgrund klinischer oder röntgenologischer Befunde mit Folgebeschwerden ihrer Degenerationsveranlagung und/oder Gliedmaßenfehlstellungen zu rechnen ist, prophylaktisch, d.h. möglichst lange vor dem Auftreten erster Beschwerden, die entsprechenden zytoplasmatischen Präparate einzusetzen.

Die züchterische Selektion hat eine Zunahme z.B. der Hüftgelenkdysplasie und der Enchondrosis intervertebralis bislang nicht verhindern können. Hunde mit Verdacht auf Disposition für eine degenerative Erkrankung sollten auch weiterhin von der Zucht ausgeschlossen werden. Die prophylaktische zytoplasmatische Therapie scheint jedoch eine Möglichkeit zu sein, solchen Hunden Leiden und einen vorzeitigen Tod und den Besitzern unnötige Therapiekosten und die Trauer über einen frühen Verlust zu ersparen.

3.4.5 Therapiearten

Die Therapieart 3 (1 x Dilutionsvorbehandlung + 1 x Sol-Präparat(e)) war mit 94 % Besserung die erfolgreichste Therapieart. Hieraus, sowie aus dem Verhältnis Körpergewicht zur Menge des applizierten Präparates (s. oben) gesagten ergibt sich die Frage, ob es überhaupt notwendig ist,

die im Therapieschema (S. 21) angegebene 2. Sol-Injektion 1 - 2 Tage nach der ersten durchzuführen. Evtl. könnte man statt dessen bei der ersten Sol-Injektion die Menge steigern. Die Erhärtung dieser These muß einer weiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.

3.4.6 Geschlecht

Degenerative Erkrankungen an Gelenken und der Wirbelsäule scheinen nicht geschlechtsspezifisch vermehrt aufzutreten. Das Verhältnis zwischen den Krankheiten entspricht sich bei beiden Geschlechtern. Fraglich ist, warum Hündinnen mit einer Besserungsquote von 94 % so viel deutlicher auf die zytoplasmatische Therapie reagieren als Rüden (84 %). Dies muß zunächst einmal als Tatsache hingenommen werden. Nach Angaben aus der Literatur (SCHLOSSAREK 1980) kann der Therapieerfolg bei der Behandlung degenerativer Gelenkerkrankungen mit zytoplasmatischen Präparaten noch gesteigert werden, wenn zusätzlich das Präparat Nr. 15 (Totale Placenta vom 1. und 2. Trimester) (Firma vitOrgan, Ostfildern) injiziert wird.

3.4.7 Vergleichende Bewertung Therapie A - Therapie B

Zu den Vergleichsmöglichkeiten beider Therapieformen muß einschränkend gesagt werden, daß es sich insgesamt nicht um einen Vergleich zwischen Therapie A und Therapie B handelt, sondern um eine

Untersuchung, ob Hunde, die auf die Therapieform A nicht oder kaum mit Besserung reagieren, mit der zytoplasmatischen Therapie in ein besseres Stadium gebracht werden können. Hunde, die sich auf Therapie A befriedigend gebessert haben, wurden für diese Untersuchung nicht erfaßt, da für eine Behandlung mit Therapie B bei diesen Patienten zunächst keine Veranlassung bestand.

Für eine statistische Aussage ist der "Tag E" nicht verwendbar, da hier für eine objektive Beurteilung die Standardisierung fehlt. "Tag E" ist bei Therapie A ja in den meisten Fällen gerade der Tag, an dem man sich für Therapie B entschieden hat, weil unter Therapie A keine Besserung mehr zu erwarten war. Außerdem sind die Untersuchungszeiträume zu unterschiedlich. Objektiv vergleichbar und für eine statistische Aussage verwertbar sind jedoch der 100. und der 180. Tag. Der 100. Tag wurde gewählt, weil nach spätestens 3 Monaten unter der zytoplasmatischen Therapie ein therapeutischer Erfolg bemerkbar sein sollte (THEURER 1985), und der 180. Tag, weil dies in etwa einem halben Jahr entspricht und für diesen Zeitpunkt insgesamt in beiden Therapieformen (A und B) noch genügend Patienten zur Beurteilung zur Verfügung standen.

Der Unterschied beider Therapieformen ist auf dem Signifikanzniveau $p \leq 0,05$ sowohl für die Bewertung, als auch für die Rezidivhäufigkeit zugunsten der zytoplasmatischen Therapie signifikant. Für den 180. Tag ist die Verminderung der Rezidivhäufigkeit unter Therapie B statistisch nicht signifikant, aber dennoch deutlich (3:1).

3.4.8 Laboruntersuchungen

Die Ergebnisse der Urin- und Blutuntersuchungen sind für eine Aussage über die Wirksamkeit oder Schädlichkeit der einen oder anderen Therapieform nicht aussagekräftig. In vereinzelten Fällen ist es bei prädisponierten Hunden (Nr. 34, 35, 42, 43 und 46) unter der Therapieform A zu Erhöhungen der Leberenzymaktivitäten gekommen, die sich unter der zytoplasmatischen Therapie wieder normalisierten. Diese Beobachtungen lassen sich jedoch statistisch nicht verifizieren und sind auch aus der Literatur nicht ohne weiteres erklärbar.

3.4.9 Nebenwirkungen

Vermehrt auftretende Hypersexualität, vor allem bei Rüden, nach Verabreichung von NeyChondrin (vermutlich auf den Anteil von Hoden im Präparat zurückzuführen) sowie eine gesteigerte Freßlust bei manchen Hunden, können als unerwünschte Nebenwirkungen, aber auch als gesteigerte Lebensfreude bezeichnet werden. Unerwünscht vor allem deshalb, weil sexuelle Aktivität und Übergewicht einer Gelenk- und Wirbelsäulenregeneration entgegenwirken können.

Da epileptiforme Anfälle bei Rüden, die dazu neigen, in Zeiten sexueller Erregung bekanntlich vermehrt auftreten können (weshalb sich diese Anfälle mit Gestagenen auch wirksam unterdrücken lassen), kann vermutet werden, daß der Rüde Nr. 42 (s.S.119) bei dem diese Anfälle nach der zytoplasmatischen Therapie vermehrt auftraten, diese

aufgrund der auch sonst zu beobachtenden sexuellen Übererregbarkeit nach NeyChondrin-Injektionen bekommen hat. Da der Hund zudem noch schlaff gelähmt war, täglich katheterisiert werden mußte und die Besitzerin die Behandlung nicht mehr finanzieren konnte, wurde der Hund auf ihren Wunsch hin eingeschläfert.

Die vorgezogene Diskussion der verendeten und euthanasierten Patienten ist jeweils am Ende der entsprechenden Einzelfallbeschreibung zu finden.

Ein direkter Zusammenhang zwischen zytoplasmatischer Therapie und Krankheits- bzw. Todesursache konnte in keinem Fall nachgewiesen werden.

Die zytoplasmatische Therapie kann aufgrund der Ergebnisse dieser Untersuchung nicht nur als sinnvolle Ergänzung zu den bisher üblichen Therapieformen bezeichnet, sondern sie sollte vor allen in therapieresistenten und besonders schwerwiegenden Fällen als Therapie der ersten Wahl in Erwägung gezogen werden.

Jeder Tierhalter hat Anspruch auf Aufklärung über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten und ihre Erfolgsaussichten. Bei einer durchschnittlichen Besserungsrate von 87 %, einer signifikanten Verringerung der Rezidivhäufigkeit und dem Fehlen schädlicher Nebenwirkungen, erfüllen die zytoplasmatischen Präparate NeyArthros und NeyChondrin bei der Behandlung degenerativer Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen in idealer Weise die alte Forderung an den Mediziner:

"Nihil nocere" oder "Heile, ohne zu schaden!"

4 ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der Untersuchung war es, den therapeutischen Effekt der zytoplasmatischen Therapie bei Hunden mit degenerativen Gelenkerkrankungen zu beschreiben und, soweit möglich, mit den im allgemeinen in der Kleintierorthopädie angewandten therapeutischen Maßnahmen zu vergleichen.

53 Hunde mit degenerativen Gelenk- und/oder Wirbelsäulenerkrankungen wurden mit den zytoplasmatischen Präparaten NeyArthros, NeyChondrin oder mit einer Kombination aus beiden Präparaten im Zeitraum Januar 1985 bis März 1986 behandelt und beobachtet. Die durchschnittliche Beobachtungsdauer pro Patient betrug 232,81 Tage.

Ausschließlich mit NeyArthros behandelte Hunde zeigten eine Besserungsrate von 95 %, ausschließlich mit NeyChondrin behandelte Hunde eine Besserungsrate von 87 %. Zusätzlich zu NeyArthros mit NeyChondrin behandelte Hunde besserten sich zu 75 %. In dieser Gruppe sind vor allem jene Patienten, die sich auf eine Behandlung mit NeyArthros allein hin nicht besserten. Teilt man die Patienten den Diagnosen entsprechend in 2 Gruppen, so ergibt sich für NeyArthros eine Besserungsrate von 87,5 % und für NeyChondrin von 85,7 %.

Die Gesamtbesserungsrate liegt bei 87 %.

Um die Therapie und ihre effektivste Form besser beurteilen zu können, wurden die Hunde mehrmals in verschiedene Gruppen eingeteilt:

29 Hunde litten unter primärer oder sekundärer Arthropathia deformans, von diesen waren 25 (86 %)

am Ende des Untersuchungszeitraumes weitgehend beschwerdefrei.

24 Hunde hatten degenerative Wirbelsäulenveränderungen. Am Ende des Untersuchungszeitraumes waren von diesen Hunden 21 (87,5 %) weitgehend beschwerdefrei.

In der Altersgruppe 1 - 5 Jahre lag die Besserungsrate bei 95 %, in der Gruppe 6 - 9 Jahre bei 81 % und bei den 10 - 13jährigen Hunden betrug sie 83 %.

Kleine und mittelgroße Rassen zeigten zu 91 % eine Besserung der Beschwerden, bei den großen und schweren Rassen lag die Besserungsrate bei 84 %.

83 % der Hunde, die nur 1 - 2 x 1 Sol-Präparat erhalten hatten, zeigten am Bewertungsstichtag weitgehende Beschwerdefreiheit. Bei den Hunden, die mit Dilutions-Präparaten vorbehandelt waren, hatten sich zum Stichtag 87 % gebessert. Hierbei lag die Besserungsrate bei den Hunden, die nach den Dilutions-Injektionen 1 x ein Sol-Präparat erhalten hatten bei 94 % und bei den Hunden, die nach den Dilutions-Injektionen 2 x 1 Sol-Präparat erhalten hatten bei 77 %. (Bei Hunden, die sich nach den Dilutions-Injektionen oder spätestens nach einer Sol-Injektion spontan besserten, wurde häufig auf die 2. Sol-Injektion verzichtet.

Die Besserungsrate lag bei den männlichen Hunden in dieser Untersuchung bei 84 % und bei den weiblichen Hunden bei 94 %.

45 Hunde waren mit den in der Kleintierorthopädie im allgemeinen angewandten therapeutischen Maßnah-

men, wie z.B. Corticosteroid- und Phenylbutazon-Präparate, vorbehandelt. Diese Therapieform wurde in vorliegender Arbeit mit "Therapie A" bezeichnet. Die zytoplasmatische Therapie bekam die Bezeichnung "Therapie B".

Ein Vergleich zwischen Therapie A und Therapie B an 2 Stichtagen (100. und 180. Tag der Behandlung) zeigt eine signifikante Erhöhung des Besserungsgrades und eine signifikante Verringerung der Rezidivhäufigkeit unter Therapie B bei gleichzeitigem Fehlen schädlicher Nebenwirkungen. (Der Unterschied in der Rezidivhäufigkeit zum 180. Tag ist zwar statistisch nicht mehr signifikant, aber dennoch deutlich).

Als "unerwünschte" Nebenwirkungen traten in einigen Fällen Hypersexualität und vermehrte Freßlust auf. Im Untersuchungszeitraum sind 4 Hunde verendet und 2 Hunde mußten euthanasiert werden. Ein Zusammenhang mit der zytoplasmatischen Therapie ließ sich in keinem Fall nachweisen.

Urin- und Blutuntersuchungen bei 21 Patienten zeigten statistisch und literarisch nicht verifizierbare Erhöhungen einiger Leberenzymaktivitäten bei 4 Hunden unter und nach Therapie A, die sich unter der zytoplasmatischen Therapie wieder normalisierten.

Die zytoplasmatische Therapie kann bei Erkrankungen des Bewegungsapparates als Therapie der 1. Wahl empfohlen werden, da sie in den meisten, selbst aussichtslos erscheinenden Fällen, nicht nur zu einer weitgehenden Beschwerdefreiheit führt, sondern auch das Allgemeinbefinden des Patienten in auffälliger Weise verbessert.

Besonders empfehlenswert ist sie in den Fällen, in denen die herkömmliche Therapie zu keiner dauerhaften, befriedigenden Besserung geführt hat.

SUMMARY

Treatment of degenerative vertebral and articular diseases with cytoplasmatic medicines compared to other therapeutical measures.

The therapeutical effect of "cytoplasmatic therapy" was to be described and to be compared to those therapeutical measures that are generally used in small animal orthopaedics.

53 dogs suffering from degenerative articular and/or vertebral diseases were treated with the cytoplasmatic medicines NeyArthros, NeyChondrin or with a combination of both between January 1985 and March 1986. The average observation period lasted for 232,81 days.

Dogs having been treated only with NeyArthros showed an average improvement of 95 %, those only treated with NeyChondrin 87 % and the ones that received NeyChondrin in addition to NeyArthros improved up to 75 %. Dividing the latter und adding them, according to their diseases, to the first two groups, leaves NeyArthros with 87,5 % and NeyChondrin with 85,7 %.

The total average improvement was 87 %.

In order to be able to judge the therapy in its most effective way, the dogs were repeatedly distributed to different groups.

29 dogs, suffering from primary or secondary arthropathia deformans had improved by the end of the observation period up to 86 %.

24 dogs, suffering from degenerative vertebral changes improved up to 87,5 %.

The ages from 1 to 5 years improved up to 95 %, from 6 to 9 years up to 81 % and from 10 to 13 years up to 83 %.

91 % of the small and middle size breeds and 84 % of the big and haevy breeds increased their improvement.

Improvement was shown by

83 % of those dogs that only received once or twice one "Sol"-injection. 87 % of those dogs having been pretreated with "Dilutions". Of these, those that received only one "Sol"-injection after the "Dilutions" improved up to 94 % and those that got 2 "Sol"-injections after "Dilutions"-pretreatment up to 77 %. (Many dogs that improved immediately after the Dilutions-pretreatment or after one "Sol"-injection did not get a second "Sol"-injection).

Male dogs improved up to 84 % and female up to 94 %.

45 dogs were pretreated with therapeutical measures, that are generally used in small animal orthopaedics i.e., corticosteroids, phenylbutazon etc. ("classical therapy"). In this analysis, that kind of therapy is called "therapy A" and the cytoplasmatic therapy is called "therapy B".

Comparing therapy A with therapy B on two fixed days (100th and 180th day of therapy) shows a significant increase of improvement and a significant decrease of recidives during therapy B, while no noxious side-effects could be reported. (The difference until the 180th day is statistically not significant but obvious (3:1)).

Some undesired side-effects were increased sexuality, (especially on male dogs) and an increase of appetite in some dogs.

During the observation period 4 dogs died and 2 had to be put to sleep. No connection with cytoplasmatic therapy could be proved in these cases.

Cytoplasmatic therapy can be recommended for arthro- and discopathic diseases as "therapy of the first choice" especially in those cases which seem to be incurable, or did not react to "classical" therapy, because it does not only lead to an extensive lack of pain, but also increases the well-being of the patient in an obvious way.

LITERATURVERZEICHNIS

- AMBRONN, G.: Bedeutung der zytoplasmatischen Therapie in der veterinärmedizinischen Praxis bei Tumoren, Spondylosen und in der Geriatrie. Therapiewoche 35, 45 - 47 (1985)
- AMBRONN, G.: Zytoplasmatische Therapie bei Kleintieren. Biologische Veterinärmedizin 1, 8 - 10 (1986)
- ARTMEIER, P. u. I. KÜHN: 15 Jahre zytoplasmatische Therapie in der Kleintierpraxis. Prakt. Tierarzt 62, 412 - 413 (1981)
- BARTHOLD, S.: Erfahrungen mit der zytoplasmatischen Therapie in der Kleintierpraxis. Kleintierpraxis 24, 35 - 37 (1979)
- BARTHOLD, S.: Weitere Erfahrungen in einer Kleintierpraxis mit der zytoplasmatischen Therapie. Erfahrungsheilkunde 29, 248 - 249 (1980)
- BARTHOLD, S.: Bewährte organo-therapeutische Anwendungen in der Kleintierpraxis. Erfahrungsheilkunde 30, 228 - 230 (1980)
- BARTHOLD, S.: Zytoplasmatische Therapie in der Kleintierpraxis: Indikation und Erfahrung. Therapiewoche 36, 33 - 37 (1986)

- BEHRINGWERKE AG,
Frankfurt:
- Topographisch-anatomische Darstellung zur Injektionstechnik bei Pferd, Rind, Hund und Katze.
(ohne Jahresangabe)
- BERNS, S.:
- Untersuchungen zur Wirkung einer zellspezifischen Substanz auf die experimentell geschädigte Rattenleber. Vet. Diss. München 1982
- BOESSNECK, J.:
- Mosaik der Geschichte der Tierchirurgie.
In: H. SCHEBITZ und W. BRASS: Allgemeine Chirurgie für Tierärzte und Studierende.
Parey, Hamburg 1975
- BRAUN, H.:
- Erfahrungen mit der intraartikulären Behandlung bei der Chondropathie des Kniegelenkes mit NeyChondrin und NeyArthros.
Therapiewoche 36,
63 - 64 (1986)
- BURGARD, H.:
- Geriatrische Probleme in der Kleintierpraxis und ihre biologische Behandlung.
Therapiewoche 35,
47 - 50 (1985)
- DÄMMRICH, K., W. BRASS
und H. SCHEBITZ
- Gelenke.
In: H. SCHEBITZ und W. BRASS:
Allgemeine Chirurgie für Tierärzte und Studierende.
Parey, Hamburg 1975
- DAHME, E. und
E. WEISS:
- Grundriß der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere.
Enke, Stuttgart 1983

- DROMMER, W.:
Erreger bestimmen im Zusammenspiel mit Leukozyten und Fibrin die initiale Phase der Knorpeldestruktion. In: P. OTTE: Gelenkdestruktion bei Polyarthrititis. Steinkopff, Darmstadt 1981
- DROMMER, W., G. TRAUTWEIN, J. MUMME, J. WINKELMANN und A.-K. MAHDI:
Zur Alteration des Knorpels durch mikrobielle Erreger und Granulozyten. Arzneim.-Forschung 32, 1368 - 1375 (1982)
- EICHER, E.:
Einbeziehung der zytologischen Therapie in einer allopathisch ausgerichteten Kleintierpraxis mit überwiegend geriatrischem Patientengut. Erfahrungsheilkunde 29, 244 - 248 (1980)
- EIKMEIER, H., G. DIRKSEN und W. HOFFMANN:
Therapie innerer Krankheiten der Haustiere. Enke, Stuttgart 1980
- FAHMY, Z.:
Zwischenanalyse in einer Doppelblindstudie über klinische und laborchemische Untersuchungen mit biologischer Kombinations-therapie. Therapiewoche 34, 120 (1984)
- FRIMMER, M.:
Pharmakologie und Toxikologie. Schattauer, Stuttgart 1977

- GEESING, H.: Zytoplasmatische Therapie bei rheumatischen Erkrankungen - insbesondere pcP und Arthrosen. Erfahrungsheilkunde 31, 292 - 294 (1982)
- HANSEN, H.-J.: Erkrankungen der Zwischenwirbelscheiben (Diskuserkrankungen). In: E. JOEST: Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere. Parey, Hamburg 1969
- HARWARDT, P.: Zytoplasmatische Therapie bei Erkrankungen aus dem geriatrischen Formenkreis. Therapiewoche 36, 12 - 13 (1986)
- HAVRANEK-BALZARETTI, B.: Beitrag zur Ätiologie der Dackellähme und Vorschlag zur züchterischen Selektion. Vet. Diss. Zürich 1980
- HEUER, R.: Revitorgan-Dilutionen in der Kleintierpraxis. Kleintierpraxis 19, 59 - 60 (1974)
- HOFFMANN, Z.: Die intraartikuläre Behandlung der Monarthrit und Arthrosis mit NeyArthros. Orthopädische Praxis 15, 496 - 497 (1979)
- HOFFMANN, Z.: Behandlung entzündlicher und degenerativer Gelenkerkrankungen nach immunologischen Gesichtspunkten: Eine Alternative. Erfahrungsheilkunde 29, 178 - 181 (1980)

- HOFFMANN, Z.: 3 Jahre Erfahrung mit der Alternativtherapie bei pcP nach immunologischen Gesichtspunkten (100 Fälle). Erfahrungsheilkunde 31, 288 - 292 (1982)
- HOFFMANN, Z.: Kausalgerichtete Rheumatherapie. Therapiewoche 33, 125 - 129 (1983)
- HOFFMANN, Z.: Eine alternative Therapie der chronischen Polyarthrititis nach immunologischen Gesichtspunkten. Therapiewoche 35, 137 - 141 (1985)
- HOFFMANN, Z.: Eine alternative Therapie der cP nach immunologischen Gesichtspunkten. Therapiewoche 36, 56 - 62 (1986)
- JACOBS, V.: Erfahrungen mit Ney-Chondrin und NeyArthros bei chronischem Wirbelsäulensyndrom und bei Arthrosen in der Allgemeinpraxis. Therapiewoche 36, 62 - 63 (1986)
- KALBHEN, D.A.: Experimentell-pharmakologische Prüfung der antiarthrotischen Wirkung des Knorpelknorpelmarkextraktes Rumalon[®]. Therapiewoche 31, 4983 - 5001 (1981)
- KALBHEN, D.A. u. M. MERTZNICH: Orientierende Untersuchung zur Wirkung von Organlysaten bei der biochemisch induzierten, tierexperimentellen Arthrose. Therapiewoche 35, 51 - 53 (1985)

- KALBHEN, D.A.: Untersuchungen zur Wirkung von intramuskulär appliziertem NeyChondrin-Sol bei der biochemisch-induzierten tierexperimentellen Gonarthrose. Therapiewoche 36, 51 - 56 (1986)
- KEALY, J.K.: Röntgendiagnostik bei Hund und Katze. Enke, Stuttgart 1981
- KLÜMPER, A.: Über die Bedeutung von NeyChondrin und Ney-Arthros in der Sportmedizin. Therapiewoche 33, 136 - 138 (1983)
- KNECHT, G.: Arthrosis deformans des Hüftgelenkes, Arthropathia ankylopoetica der Wirbelsäule und Spondylosis deformans: Erfolgreiche Behandlung mit der zytoplasmatischen Therapie. Erfahrungsheilkunde 31, 306 - 307 (1982)
- KOLLEGIUM BIOMATHEMATIK NW: Biomathematik für Mediziner. Springer, Berlin 1976
- KRAFT, H.: Die Gegensensibilisierung bei Tieren mit chronischen Erkrankungen. Tierärztl. Umschau 6, 273 (1973)
- KRAFT, H.: Intramuskuläre Injektion und Enzymdiagnostik. Tierärztl. Umschau 12, 656 (1974)

- KRAFT, H.: Klinische Erfahrungen mit der zytoplasmatischen Therapie und der Gegsensensibilisierung. Prakt. Tierarzt 57, 115 (1976) cv
- KRAFT, H.: Verabreichung zytoplasmatischer Substanzen. Prakt. Tierarzt 58, 111 - 112 (1977) cv
- KRAFT, H.: Die zytoplasmatische Therapie in der Kleintierpraxis. Prakt. Tierarzt 58, 136 (1977) cv
- KRAFT, H.: Tierexperimentelle Erfahrungen mit der zytoplasmatischen Therapie. Erfahrungsheilkunde 8, 613 - 618 (1979)
- KRAFT, H.: Therapie der Erkrankung von Gelenken und der Wirbelsäule beim Hund mit makromolekularen Substanzen. Prakt. Tierarzt 62, 9 - 12 (1981) cv
- KRAFT, H.: Untersuchungen über die Beeinflussung von Laborwerten beim Hund nach Verabreichung von zytoplasmatischen Substanzen im Zusammenhang mit muskelreizenden Stoffen. Erfahrungsheilkunde 30, 224 - 225 (1981)
- KRAFT, H.: Verabreichung zytoplasmatischer Organsubstanzen per aerosolem. Erfahrungsheilkunde 31, 304 - 305 (1982)

- KRAFT, H.: Frischzellen und zytoplasmatische Therapie - ein Überblick. Tierärztl. Umschau 39, 205 - 208 (1984)
- KRAFT, H.: Die Beeinflussung veränderter Blutbilder bei Hund und Katze mit zytoplasmatischen Substanzen. Therapiewoche 34, 137 - 138 (1984)
- KRAFT, H.: Rückblick und Ausblick über die Möglichkeiten der zytoplasmatischen Therapie in der Veterinärmedizin. Therapiewoche 35, 39 - 44 (1985)
- KUGLER, K.H. und E. KRUG: Zytoplasmatische Therapie und Modifikation der Eigenblutbehandlung. Praxisfibel vitOrgan-Arzneimittel GmbH, Ostfildern 1985
- KUSCHINSKY, G. und H. LÜLLMANN: Kurzes Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie. Thieme, Stuttgart 1978
- LACHNIT, K.-S., A. KLAUSNER, E. PROSZOWSKI und L. RIEDER: Altern und Krankheit - ein makromolekulares Problem? Therapiewoche 33, 143 - 149 (1983)
- LACHNIT, K.-S.: Behandlung von Arthrosen mit zytoplasmatischen Substanzen. Therapiewoche 33, 130 - 135 (1983)

- LACHNIT, K.-S., H. LUHAN
und I. RIECK: Der alternde Mensch
im therapeutischen
Blickpunkt.
Therapiewoche 35,
171 - 175 (1985)
- LACHNIT, K.-S.: Die Gelenkveränderun-
gen im Alter: Ein
echtes Problem für
die Praxis.
Therapiewoche 36,
16 - 25 (1986)
- LEHNHARDT; K.: Erfahrungen bei der
Behandlung mit NeyAr-
thros bei degenerati-
ven Erkrankungen.
Therapiewoche 36,
65 - 67 (1986)
- LEINER, G.: Behandlung von arthro-
tischen Erkrankungen
mit zytoplasmatischen
Präparaten.
Therapiewoche 36,
67 - 71 (1986)
- MAYR, A.: Paramunologie: Eine
neue Perspektive für
die zytoplasmatische
Therapie.
Therapiewoche 35,
145 - 148 (1985)
- NICKEL, R., A. SCHUMMER
und E. SEIFERLE: Lehrbuch der Anatomie
der Haustiere.
Band I
Parey, Hamburg
1977
- NIEMAND, H.G.: Praktikum der Hunde-
klinik.
Parey, Hamburg
1984
- PAFFENHOLZ, V. und
K. THEURER: Wirkung makromolekula-
rer Organsubstanzen
auf Humanzellen in der
Gewebekultur.
Kassenarzt 27,
5218 - 5226 (1978)

- PAFFENHOLZ, V.: Wirkungsprüfung zytoplasmatischer Präparate an menschlichen Zellkulturen. Erfahrungsheilkunde 29, 173 - 174 (1980)
- PETER, H.: Der Wirkungsmechanismus zytoplasmatischer Präparate aufgrund experimenteller Untersuchungen. Tagungsbericht XXIV. Jahrestagung zytoplasmatischer Therapie Enke, Stuttgart 1978
- PETER, H.: Praktische Durchführung der zytoplasmatischen Therapie und der Gegensensibilisierung. Erfahrungsheilkunde 29, 174 - 175 (1980)
- PORCHER, H.: Zytoplasmatische Therapie und Gegensensibilisierung: Molekular-biologische und immunologische Grundlagen. Erfahrungsheilkunde 29, 171 - 173 (1980)
- PORCHER, H. und K. THEURER: Biomimetik als Chance: Ein neues therapeutisches Prinzip. Enke, Stuttgart 1980
- PORCHER, H.: Biologische Alternativen in der Veterinärmedizin: Zytoplasmatische Therapie und Gegensensibilisierung. Tierärztl. Umschau 39, 284 - 289 (1984)

- RUBARTH, S. und
N.E. BÖRKLUND:
Regressive Veränderungen. In: W. FREY:
Allgemeine Pathologie.
Parey, Hamburg
1972
- RÜSSE, M. und
H. KRAFT:
Unterschiede der Zel-
lulartherapie gegen-
über der makromoleku-
laren zytoplasmati-
schen Therapie.
Prakt. Tierarzt 57,
559 (1976)
- SANDERSLEBEN; von, J.,
K. DÄMMRICH und
E. DAHME:
Pathologische Histolo-
gie der Haustiere.
Fischer, Stuttgart
1981
- SCHLOSSAREK, U.:
Zytoplasmatische The-
rapie akuter und chro-
nischer Erkrankungen
bei Hunden und Katzen.
Berliner und Münchner
Tierärztl. Wochen-
schrift 76,
169 - 172 (1963)
- SCHLOSSAREK, U.:
Die zytoplasmatische
Therapie aus der Sicht
eines praktischen
Tierarztes.
Erfahrungsheilkunde 29,
250 - 251 (1980)
- SCHLOSSAREK, U.:
Zytoplasmatische The-
rapie bei Arthritiden
und Arthrosen in der
Kleintierpraxis.
Prakt. Tierarzt 62,
7 - 8 (1981)
- SCHLOSSAREK, U.:
Gezielte Anwendung der
makromolekularen zyto-
plasmatischen Organo-
therapie in der Klein-
tierpraxis - 25jährige
Erfahrungen.
Tierärztl. Umschau 36,
194 - 204 (1981)

- SCHLOSSAREK, U.: Zytoplasmatische Behandlung bei Arthritiden und Arthrosen in der Kleintierpraxis. Erfahrungsheilkunde 31, 308 - 309 (1982)
- SCHLOSSAREK, U.: Gezielte Zelltherapie in der Kleintierpraxis. Prakt. Tierarzt 5, 426 - 434 (1985)
- SCHMIDL, M.: Laboruntersuchungen für die Diagnose und Verlaufskontrolle in der Veterinärmedizin. Boehringer, Mannheim 1981
- SCHMITT, E. und F.W. SCHMITT: Kleine Enzymfibel. Schriftenreihe Diagnostika. Boehringer, Mannheim 1973
- SILBERNAGL, S. und A. DESPOPOULOS: Taschenatlas der Physiologie. Thieme, Stuttgart 1979
- SILBERSIEPE, E., A. BERGE und H. MÜLLER: Lehrbuch der speziellen Chirurgie. Enke, Stuttgart 1976
- SUTER, P.F.: Wirbelsäule, Spina. In: H.G. NIEMAND: Praktikum der Hundeklinik. Parey, Hamburg 1984
- THEURER, K.: Die zytoplasmatische Therapie. Kleintierpraxis 9, 113 - 115 (1964)
- THEURER, K., G.F. DOMAGK und H. KRAFT: Wiederherstellung und Erneuerung als Prinzipien der Organo- und Immunotherapie. Enke, Stuttgart 1981

- THEURER, K.E., G.F. DOMAGK
und H. KRAFT: Organo- und Immunothe-
rapie als neue Denk-
weise in der Medizin.
Enke, Stuttgart
1982
- THEURER, K.E., G.F. DOMAGK
und H. KRAFT: Organo- und Immunothe-
rapie, eine rational
begründete, wissen-
schaftlich fundierte
Ganzheitsmedizin.
Enke, Stuttgart
1983
- THEURER, K.E., G.F. DOMAGK
und H. KRAFT: Organo- und Immunothe-
rapie, Paradigmawech-
sel in der Medizin.
Enke, Stuttgart
1984
- THEURER, K.E., G.F. DOMAGK
und H. KRAFT: 30 Jahre zytoplasmati-
sche Therapie und Ge-
gensensibilisierung.
Enke, Stuttgart
1985
- THEURER, K.G.: Die zytoplasmatische
Therapie und die Me-
thoden der Serum-De-
sensibilisierung:
Ein integrales thera-
peutisches System.
Therapiewoche 34,
9 - 18 (1984)
- WANDERKA, H.: Experimentelle Unter-
suchung über die rege-
nerierende Wirkung von
NeyChondrin, NeyArthros
und NeyGeront auf das
Stütz- und Knorpelge-
webe.
Therapiewoche 33,
116 - 135 (1983)
- WANDERKA, H.: Experimentelle Studie
über die regenerieren-
de Wirkung von Ney-
Chondrin, NeyArthros
und NeyGeront auf das
Stütz- und Knorpelge-
webe. Teil 1.
Therapiewoche 35,
135 - 137 (1985)

WANDERKA, H.:

Experimentelle Studie
über die regenerieren-
de Wirkung von Ney-
Chondrin, NeyArthros
und NeyGeront auf das
Stütz- und Knorpelge-
webe. Teil 2: Bild-
dokumentation.
Therapiewoche 36,
77 - 81 (1986)

WEH, L., G. DAHMEN
und G. FRÖSCHLE:

Einfluß einiger intra-
artikulär applizierba-
rer Pharmaka auf die
mechanischen Gelenk-
knorpel Eigenschaften
in vitro.
Aktuelle Rheumatolo-
gie 6,
175 - 180 (1981)

WEH, L. und
G. FRÖSCHLE:

Überlebensverhalten
und Biomechanik ex-
plantierter humaner
Knorpelgewebe und de-
ren Beeinflussung
durch heterologe zyto-
plasmatische Gewebsex-
trakte aus Knorpel
und Synovia.
Erfahrungsheilkunde 31,
285 - 287 (1982)

WIGGE, B.:

Untersuchungen über
die Wirkung organspe-
zifischer Substanzen
auf die Spätfolgen der
im Experiment geschä-
digten Lebern von Al-
binoratten.
Kleintierpraxis 20,
131 - 136 (1975)

Die Sektionsbefunde wurden am Institut für Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover(Fälle Nr. 3 und 29(2.Befund), am Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt in Krefeld (Fall Nr. 5) und am Institut für Tierpathologie der Universität München Fall Nr.29) erhoben.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. H. Kraft für die Überlassung des Themas und der engagierten Betreuung und Beratung auch über 700 km hinweg.

Herrn Prof. Dr. F.-R. Diepenbrock von der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal danke ich sehr für die freundliche Beratung bei der Ausarbeitung der Zahlen und Statistiken.

Frau P. Schönwald möchte ich für die exakten Schreifarbeiten danken, die sie für mich erledigt hat.

Ohne die großzügige Unterstützung durch den Klinikinhaber, Herrn Dr. Wilfried Müller, der nicht nur Klinik, Personal und Patienten zur Verfügung gestellt hat, sondern mir auch stets mit Rat und Tat zur Seite stand, wäre diese Arbeit als Feldarbeit nicht möglich gewesen.

Wenn ich ihm deshalb diese Arbeit widme, so kann dies nur ein kleiner Teil des Dankes sein, den ich ihm schulde.

Meiner Frau danke ich für die ständige, liebevolle, moralische Unterstützung.

Edgar Freiherr von Cramm
Wuppertal

Lebenslauf

30.10.1951	geboren in Göttingen als Sohn des Zahnarztes Dr. Thedel Freiherr von Cramm und seiner Frau Annemarie Freifrau von Cramm, geb. von der Osten
1957 - 1960	Volksschule in Göttingen, Stuttgart-Vaihingen und Augustdorf bei Detmold
1960 - 1972	Gymnasium in Detmold, Hessisch-Lichtenau und bis zum Abitur im Land-erziehungsheim Stiftung Louisenlund bei Eckernförde
1972 - 1974	Studium der katholischen Theologie als Priesteramtskandidat an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau
1974 - 1975	Aufenthalt in Pakistan bei den Eltern
1975 - 1977	Flugbegleiter bei der Deutschen Lufthansa A.G.
1977 - 1983	Studium der Veterinärmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München
Seit November 1978	verheiratet mit Dagmar Freifrau von Cramm, geb. Frowein; 2 Söhne, Cornelius (1982) und Nicolaus (1985)
1983	Approbation als Tierarzt
Seit Januar 1984	Assistenzarzt an der tierärztlichen Klinik Dr. W. Müller in Wuppertal

Vorliegende Dissertation habe ich seit Januar 1985 in der tierärztlichen Klinik Dr. W. Müller in Wuppertal angefertigt.

